

Ein Beitrag zur Pathologie und Therapie

des

Diabetes mellitus.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung des Grades eines

Doctors der Medicin

verfasst und mit Bewilligung

Einer Hochverordneten Medicinischen Facultät der Kaiserl.
Universität zu Dorpat

zur öffentlichen Vertheidigung bestimmt

von

Hans Reyher

Rigenser.

Ordentliche Opponenten:

Doc. Dr. C. Dehio. — Prof. Dr. A. Vogel. — Prof. F. A. Hoffmann.

Dorpat.

Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei.

1885.

Gedruckt mit Genehmigung der medicinischen Facultät.
Dorpat, den 3. October 1885.

Nr. 392.

Decan: Stieda.

Meinen theuren Eltern

IN LIEBE UND DANKBARKEIT

gewidmet.

Bei meinem Scheiden von der hiesigen Hochschule ist es mir Bedürfniss, allen meinen hochverehrten Lehrern auch an dieser Stelle meinen aufrichtigsten Dank für die während meiner Studienzeit erhaltene wissenschaftliche Ausbildung abzustatten.

Zu ganz besonderem Danke aber bin ich Prof. F. A. Hoffmann für die mir bei vorliegender Arbeit zu Theil gewordene Anregung und liebenswürdige Unterstützung verpflichtet.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

I.

Einleitung.

Es liegt mir fern auch nur annähernd auf Grundlage der vorliegenden Beobachtung an den augenblicklich bestehenden Theorieen über den Diabetes mellitus rütteln, geschweige eine derselben angreifen zu wollen.

Beim Einblick in die grosse Literatur dieser schweren Stoffwechselerkrankung gewinnt man die Ueberzeugung, dass die sich beim Diabetes mellitus abspielenden Vorgänge zu den verwickeltsten gehören und wir, bei der in vieler Beziehung noch lückenhaften physiologischen Grundlage, verwerthbare Bausteine zur einstmaligen Lösung dieser Frage nur durch gewissenhafte und sorgfältige Beobachtungen zu liefern im Stande sind. Daher habe ich bei den von mir angestellten Untersuchungen, wie unten ersichtlich, die grösstmögliche Sorgfalt zu beobachten gesucht, indem ich jedes neue Resultat zum mindesten einer Controlle unterzog.

Die Hauptaufgabe bei so schwierigen Untersuchungen lag für mich in der strengsten Isolirung

des Patienten, denn nur bei peinlichster Erfüllung dieser Grundbedingung liessen sich sichere, verwerthbare Daten erzielen, wenn auch mit grossem Zeitaufwande selbst auf die Gefahr hin manche werthvolle Untersuchung aus Zeitmangel fortlassen zu müssen.

Bei Durchmusterung der Literatur ist es mir aber voll und ganz zum Bewusstsein gekommen, wie werthvoll auch die kleinste Beobachtung, wenn sie nur positiv sichere Daten zu bieten im Stande ist; denn nicht die Masse der Beobachtungen, wol aber die Sorgfalt der Ausführung, mit welcher jede einzelne Untersuchung angestellt wird, ist für die einstmalige Lösung dieser wichtigen Stoffwechselfrage Ausschlag gebend, sie verleiht auch der kleinsten Arbeit wissenschaftlichen Werth.

Meine Bemühungen erstrebten daher vorherrschend Thatsachen, welche aus den Beobachtungen vorliegenden Falles resultirten, zu bieten und mich möglichst fern von jeglichem Theoretisiren zu halten, da letzteres nur möglich bei Verarbeitung grösseren Beobachtungsmaterials und grösserer Erfahrung, als sie mir auf Grundlage einer einzigen Beobachtung zu Gebote stand.

Gern hätte ich die Untersuchungen noch weiter fortgesetzt, doch wurden denselben durch die anzuwendende sorgfältige Controlle, wenn sie in gleicher

Weise fortgesetzt werden sollte, natürliche Grenzen gesteckt.

Eine einleitende Besprechung der Diabetes-Literatur glaubte ich bei der grossen Anzahl von Monographien mit Recht umgehen zu dürfen, zumal Senator¹⁾ eine solche in ausgiebiger Weise chronologisch geordnet zusammengestellt hat.

1) Senator, Diabetes mellitus und insipidus. Ziemssen, Handbuch der speciellen Pathol. und Therap. Band XIII, 2. p. 111.

II.

Anamnese und Status praesens.

Anamnese. M. R. aus Awwinorm von estnischer Abkunft, 26 Jahre alt, unverheiratet, stammt aus gesunder Familie. Sein Vater hat sich ausser einem Leiden am Fusse, welches er durch Congelation acquirirt haben soll, stets einer trefflichen Gesundheit zu erfreuen gehabt. Seine Mutter ist vor 6 Jahren am Typhus gestorben. Geschwister nicht vorhanden.

Patient hat bis zum Beginn der jetzigen Krankheit sich stets wohl gefühlt und giebt an, nie eine Krankheit durchgemacht zu haben, was auch die Verwandten bestätigen. Nach deren Angabe soll Patient bis vor anderthalb Jahren noch gesund und wohlgenährt ausgesehen haben.

Ueber den Beginn seines Leidens will Pat. genau orientirt sein. Vor $1\frac{1}{2}$ Jahren hat er eine seine Kräfte übersteigende Last Brennholz aus dem Walde getragen und sich seit dem Tage auffallend schwach und elend gefühlt. Als erstes Symptom der Krank-

heit giebt Pat. krampfartige Schmerzen an, die gleichzeitig in beiden Waden aufgetreten sein sollen; zugleich hätte sich von dem Tage an unstillbarer Durst und Heisshunger eingestellt. Eine Woche später machten sich beiderseits Lendenschmerzen und eine beträchtliche Schwellung der unteren Extremitäten bemerkbar. Bis gegen Weihnachten 1884 hielten Schmerzen und Schwellung an. Am 30. Januar 1884 wandte sich Pat. an Dr. med. F. in Z., welcher Folgendes constatirte: Spec. Gew. des Harns 1,025, Trommersche Probe deutlich, die Abmagerung bedeutend. Nach Angabe desselben Arztes soll im Febr. 1885 beiderseits der Staar aufgetreten sein und zwar behauptet Pat. auf dem rechten Auge die Sehstörung früher bemerkt zu haben. Am 1. Mai 1885 suchte Pat. seines Augenleidens wegen die Augenklinik auf, wurde von dort an die Medicin. Klinik gewiesen, in der Pat. an demselben Tage in den Krankenbestand aufgenommen wurde und bis zum 14. Mai 1885 unter klinischer Behandlung verblieb.

Pat. erhielt in den ersten Tagen Acid. lactic. Die letzten 10 Tage blieb Pat. ohne jede medicamentöse und diätetische Behandlung. Bis zum 14. Mai hat Pat. stets gemischte Kost, in der Amylaceen reichlich vertreten waren, zu sich genommen. Trotz seines guten Appetits war eine Abnahme des Körpergewichts zu constatiren; der Durst war sehr stark.

Die absolute Zuckermenge, welche Pat. in 24 Stunden bisher ausschied, schwankte nach den Angaben im Krankenbogen¹⁾ zwischen 207,9 bis 876,42 Grm., die Harnmenge zwischen 3000 und 9000 Ccm. in 24 Stunden.

Das Allgemeinbefinden wurde mit jedem Tage schlechter. Athembeschwerden, sowie Schmerzen auf der Brust will Pat. nicht empfunden haben. Während des Aufenthaltes in der Klinik bemächtigte sich seiner eine hochgradige, zunehmende Muskelschwäche.

Status praesens vom 14. Mai 1885. Pat. von mittlerer Grösse macht einen wahrhaft jämmerlichen Eindruck. Knochenbau gracil und überall ohne Deformitäten. Muskulatur stark reducirt. Pat. kann nur mit grosser Anstrengung gehen. Panniculus adiposus gänzlich geschwunden. Die Hautfarbe, durchweg schmutzig-grau und anämisch, fühlt sich sehr kühl und trocken an, schilfert stellenweise ab. Furuncul, Exantheme etc. nicht vorhanden. Körpertemperatur normal. Haare dünn. Pat. ist über seinen Zustand sehr bekümmert. Schlaf unruhig. Motilitäts- und Sensibilitätsstörungen nicht nachweisbar. Pat. klagt über Kopfweh, Schwindel. Sensorium nicht immer frei.

Die Sinnesorgane mit Ausnahme der Augen

1) Krankenbogen Nr. 181, Medicin. Klinik, Dorpat. (1885).

functioniren normal. Das Sehvermögen ist durch beiderseitige Linsentrübungen in hohem Grade gesunken. Pat. vermag die Zahl der ihm vorgehaltenen Finger nicht anzugeben.

Thorax flach, unter der rechten Clavicula verschärftes Expirium. Husten nicht vorhanden.

Herztöne rein. Puls leicht comprimierbar; Pulsfrequenz Abends 80, Morgens 76. Pat. klagt über unstillbaren Hunger und Durst. Die Zähne sind gut erhalten. Die Mundflüssigkeit reagirt sauer. Zunge belegt. Der Geruch aus dem Munde eigenthümlich aromatisch.

Leber und Milz von normaler Grösse. Stuhlgang regelmässig. Geschlechtstheile ohne Veränderungen. Pollutionen seit langer Zeit ausgeblieben. Harnmenge in 24 Stunden 4430 Ccm. Der Harn enthält 7 % Zucker, ist frei von Eiweiss. Spec. Gew. 1,032. Reaction sauer. Der Harn ist blass-gelb, schillert ins Grünliche und wird nach einigen Stunden trübe. Microscopisch lassen sich Harnsäurekrystalle nachweisen. Geruch aromatisch. Eisenchlorid-Reaction negativ.

III.

Untersuchungsplan.

Wie aus der Anamnese und dem Status praesens ersichtlich, liegt uns ein Fall von Diabetes melitus vor, welcher umsomehr zu Untersuchungen über den Stoffwechsel dieser noch so räthselhaften Krankheit aufforderte, da örtliche Organerkrankungen wie Nephritis, Phthisis, Hautkrankheiten etc. bisher nicht aufgetreten waren, welche im höchsten Grade störend, so oft schon manche werthvolle Untersuchungsreihe durchbrochen, manche mühevollen Arbeit vereitelt haben.

Da Pat. bei Beginn der angestellten Untersuchungen sich in so jämmerlichem Zustande befand und eine klinische Behandlung bei der nicht durchführbaren Controlle reiner Fleischdiät, zumal bei den schon so vorgerückten Krankheitserscheinungen, bisher unterbleiben musste, war es umsomehr indicirt den Pat. zu isoliren und unter die strengste Controlle zu stellen, wenn irgend welche Besserung in dem Zustande des Pat. noch erreicht und ein werthvolles Beobachtungsmaterial geboten werden sollte.

Um jede Möglichkeit einer Täuschung bei der einzuleitenden diätetischen Behandlung, welcher sich, wie aus der Literatur bekannt, selbst die gebildetesten Diabetiker zu Schulden kommen lassen, zu vereiteln, um jede Zufuhr von Nahrungsmitteln zu überwachen, jeden Verlust an Excreten fern zu halten, bezogen Pat. und ich am 14. Mai 1885 das mir von Prof. F. A. Hoffmann zu meinen Beobachtungen freundlich bewilligte Zimmer in der oberen Etage der Med. Klinik. Um jeden Unterschleif von Seiten der Wärterin auszuschliessen, durfte dieselbe nur zur bestimmten Zeit in meiner Gegenwart die Stube säubern, während sie und der Pat. keinen Augenblick unbeobachtet blieben, und sich dem Kranken nur auf 5 Schritte nähern, eine Grenze, die ihr durch Stühle gesteckt worden war. Das Essen wurde mir eigenhändig durch dieselbe Wärterin übergeben. Letzterer war ausserdem bei Nachweis irgend welchen Betruges mit sofortiger Entlassung gedroht. Bei Uebernahme des Pat. wurde er von mir selbst neu eingekleidet; Schlafrock, Wäsche, Bett, jeder Winkel des Zimmers einer genauen Controlle unterzogen. Die Fenster wurden versiegelt. Der Zugang zu Ofen, Wasserleitung und Ausguss war derartig erschwert, dass die geringste Berührung sofort aufgefallen wäre; Wasser erlangen oder Excrete entfernen war durch geeignete Vorrichtungen unmöglich.

Pat. wurde ausserdem so reichlich mit Speise und Trank versehen, dass diese Vorrichtung unnütz gewesen wäre, wenn nicht dergleichen unberechenbare und unverständliche Handlungen gerade von Diabetikern bekannt wären, welche trotz aller Versprechungen ohne Grund und Ursache, zum Beispiel wie Külz referirt, gelegentlich den Urin zum Fenster hinausgiessen.

Da ich am Vormittage oft stundenlang im Laboratorium von Prof. F. A. Hoffmann arbeitete waren diese Vorsichtsmaassregeln um so nothwendiger. Die Thür war bei jedesmaligem Verlassen des Pat. versiegelt, da ich auch vor einem Oeffnen der Thür vermittels Nachschlüsseln mich sichern wollte. Des Nachts wurde der Schlüssel abgezogen und die Thür gleichfalls versiegelt, um auch während ich schlief einen Unterschleif mittelst Nachschlüsseln zu vereiteln, denn mehrere derselben befanden sich in der Hand eines, dem Pat. befreundeten, Wärters.

Um mich von der Angabe des Pat., sein Sehvermögen sei derart reducirt, dass er die ihm vorgehaltene Anzahl von Fingern nicht angeben könne, andererseits aber, um mich von dem Thun und Treiben desselben während meiner Abwesenheit zu überzeugen, versuchte ich ihn wiederholt zu täuschen, da Pat. mir keineswegs zuverlässig erschien. Die

Resultate dieser Controlle habe ich unten unter »Tägliche Beobachtungen« verzeichnet.

Vom 7. — 15. Juni wurde Pat. Tag und Nacht keinen Augenblick ohne genaue Beobachtung gelassen, da die Resultate zu werthvoll waren und ich auf diese Weise durch die liebenswürdige Unterstützung eines mir befreundeten älteren Mediciners in den Stand gesetzt war, wenigstens für eine kurze Zeit auch noch diese Garantie für die Sicherheit der Beobachtung zu bieten, die besonders für die Feststellung der Perspiratio insensibilis wünschenswerth war. Die Nachtwache wurde abwechselnd übernommen.

Ich glaubte eine genaue Beschreibung der Cautelen, unter welchen ich meine Untersuchungen anstellte, geben zu müssen; bin daher mehr in's Detail gegangen, als ich anfangs beabsichtigte, habe es aber trotzdem nicht unterlassen, da bei Arbeiten auf diesem Gebiete, wenn sie annähernd einen Werth haben sollen, die Garantie sorgfältiger Beobachtung zu Grunde liegen muss.

Jeder einzelne Versuch dauerte von 8 Uhr Morg. des einen bis 8 Uhr Morgens des andern Tages. Pat. brachte anfangs Tag und Nacht auf dem Bette liegend zu, dazwischen sass er einige Minuten, bis er in letzter Zeit so weit gekräftigt war, einmal sogar 25 Minuten im Zimmer auf und ab gehen zu können. (cf. 13. VI).

Da Pat. sich in oben geschildertem Schwächezustande befand und jede Anordnung durch seinen Widerspruch zu vereiteln drohte, sicherte ich Pat. bei der ihm in Aussicht gestellten, längere Zeit andauernden Fleischdiät zu, ihm die Nahrungszufuhr in keiner Weise einzuschränken, zumal er nur unter dieser Bedingung einer diätetischen Behandlung sich unterziehen wollte.

Es war daher anfangs unmöglich Pat., wenn seine psychische Depression gehoben werden sollte, täglich dieselbe Quantität Nahrung, geschweige in derselben Form, zuzuführen. In der IV. Periode jedoch gelang es mir endlich, wenigstens für 6 Tage, Pat. zu bewegen, dieselben Speisen in gleicher Quantität zur bestimmten Stunde zu sich zu nehmen.

In der ersten Periode (15.—17. Mai) wurde Pat. die kohlehydratreiche Kost allmählich entzogen um zur absoluten Fleischdiät überzugehen, welche sich auf die Tage vom 18.—25 Mai (II. Periode) erstreckte. Vom 26. Mai bis 6. Juni (III. Periode) wurden Pat. kleine Mengen Milch bei sonstiger absoluter Fleischdiät verabfolgt. Die letzte Periode vom 7. bis 15. Juni stand Pat. bei Einhaltung absoluter Fleischdiät unter ununterbrochener Aufsicht, so dass jeder Vorfall Tags und Nachts notirt werden konnte.

Pat. erhielt drei Mal täglich seine Mahlzeit (8 $\frac{1}{2}$ Uhr Morgens, 1 Uhr Mittags, 6 Uhr Abends), wie

vor den von mir angestellten Beobachtungen, da er keineswegs auf eine andere Vertheilung der Mahlzeit eingehen wollte.

Die fertig zubereiteten Speisen und Getränke wurden jedes Mal kurz vor der Mahlzeit von mir selbst gewogen¹⁾. Pat. musste seine Nahrung stets unter meiner Aufsicht zu sich nehmen, um bei dem so stark reducirten Sehvermögen manche Fehlerquelle durch Unachtsamkeit zu umgehen. Für das Trinkwasser benutzte Pat. ein besonderes grosses Gefäss, welches, um ein Verschütten zu vermeiden, nur bis zur Hälfte gefüllt und leicht erreichbar war.

Wenn ich mich auf Stunden vom Pat. entfernen musste, inspicierte ich bei der Rückkehr stets den Schlafrock und die Wäsche desselben, um, falls ich sie feucht gefunden hätte, den betreffenden Versuchstag auszuschalten. Pat. ging mit dem Trinkwasser in jeder Beziehung vorsichtig um.

In Bezug auf die Wahl der Nahrungsmittel trug ich den Wünschen des Pat. innerhalb der gesteckten Grenzen Rechnung, da es darauf ankam, annähernd dasselbe Régime mehrere Wochen strengstens einzuhalten.

1) Zur Anwendung gelangte eine vorzügliche kleine Decimalwage von Kutzt & Comp. Brandenburg. Eigenthum der med. Klinik. Dieselbe Wage wurde auch zu den Wägungen der Excremente benutzt.

Bei den täglichen Untersuchungen hielt ich stets dieselbe Reihenfolge ein. Die Puls- und Respirationsfrequenz wurde Morgens 8 Uhr, bevor Pat. Nahrung zu sich genommen hatte, und Abends 8 Uhr bestimmt, ebenso die Temperatur. Vor diesen Bestimmungen hatte Pat. wenigstens 20 Minuten in liegender Stellung verbracht. Die Temperatur konnte, obgleich ich sie anfangs zur Controlle zugleich in der Achselhöhle und im Anus bestimmte, vom 19. Mai an nur im Anus gemessen werden, da in Folge der grossen Abmagerung des Pat. die Temperaturangaben in der Achselhöhle um ein Bedeutendes von denen gleichzeitig im Anus nachgewiesenen differirten.

Das Körpergewicht wurde 8 Uhr Morgens vor der Nahrungsaufnahme bestimmt, nachdem Patient kurz vorher seine Blase entleert hatte. Pat. war bei der Wägung stets entkleidet, da letztere bei genügender Vorbereitung nur einige Secunden in Anspruch nahm und auf diese Weise allein die sichersten Zahlen für das absolute Körpergewicht erzielt werden konnten. Die Wage, welche zur Anwendung kam, Eigenthum der Klinik, war so empfindlich, dass eine Belastung von einigen Gramm das Gleichgewicht zu stören im Stande war.

Die Zimmertemperatur schwankte zwischen 15 und 20° Réaumur.

Der Harn wurde Abends 8 Uhr und Morgens 8 Uhr gesammelt, wobei Pat. vor Beginn des neuen Versuchstages, als auch um 8 Uhr Abends, seine Blase entleeren musste.

Bei den Stuhlentleerungen wurde jeder Verlust an Harn vermieden. Die Harnuntersuchungen konnten aus Mangel an Zeit nur ein Mal in 24 Stunden vorgenommen werden, was bei der Absorption von Zeit durch die vielen Wägungen, Messungen und Untersuchungen sich von selbst ergibt.

Die zum Aufsammeln des Harnes angewandten Gefässe wurden stets von mir selbst sorgfältig gereinigt. Die 24stündige Harnmenge wurde im Laboratorium in grossen Standgefässen unter festem Verschluss bis zur chemischen Untersuchung aufbewahrt. Die nothwendigsten Bestimmungen wurden am Vormittage im Laboratorium vorgenommen. Zur Bestimmung gelangten täglich aus der 24stündigen Harnmenge: Specf. Gew., chem. Reaction, Farbe, Durchsichtigkeit, Tag-, Nacht- und 24stündige Harnmenge, Eiweiss und Zuckergehalt des Harnes, Eisenchloridreaction, mikroskopische Untersuchung. Die 24stündige Harnmenge wurde mehrfach umgeschüttelt, Reaction, Farbe, spec. Gew. etc. bestimmt und die zu den quantitativen Untersuchungen erforderliche Menge abgegossen.

Das spec. Gew. konnte mittelst eines Urometers,

welcher geprüft war, bis auf die dritte Decimale genau bestimmt werden.

Der Zuckergehalt der 24 stündigen Harnmenge wurde täglich durch wenigstens dreimalige Titrirung mit Fehlingscher Lösung bestimmt. Die Controlle mit dem Halbschattenapparate von Laurent¹⁾ hatte Prof. Hoffmann freundlichst übernommen, der Urin wurde dazu mit essigsauerm Blei entfärbt. Bei der Titrirung gelangte zur Anwendung die von Hoppe-Seyler in seinem Handbuche der physiologisch und pathologisch-chemischen Analyse angegebene Methode (p. 395). Auch die Titrirung mit Cyan-Quecksilber in alkalischer Lösung, wie sie von Knapp²⁾ angegeben ist, wurde einige Mal zur Controlle von Prof. Hoffmann angestellt.

Die Phenolbestimmung im Harne nach Eingabe von Benzol wurde entsprechend den Angaben von Hoppe-Seyler³⁾ ausgeführt.

Die Excremente wurden sofort nach der Entleerung gewogen, mit Ausnahme jener Stuhlgänge, die in meiner Abwesenheit erfolgt waren, dann aber kamen sie höchstens 2 Stunden später zur Wägung, da ich mich nie auf noch längere Zeit entfernt hatte.

1) Privateigenthum von Prof. F. A. Hoffmann.

2) Ann. Chem. Pharm. Bd 154, p. 252.

3) Hoppe-Seyler, Handbuch der physiologisch- und pathologisch-chemischen Analyse, p. 194, Berlin 1883.

Des Nachts wurden die Faeces auch sofort nach der Entleerung gewogen. Neben dem Gewicht wurden bei jeder Entleerung Farbe, Geruch, Consistenz, Fett- und Schleimgehalt geprüft, wie aus den Tabellen ersichtlich.

Neben der rein diätetischen Behandlung wurde die medicamentöse soviel, wie irgend möglich, ferngehalten, um reine Untersuchungsergebnisse zu erzielen.

IV.

Tägliche Beobachtungen.

Die Ergebnisse der 31-tägigen geschlossenen Versuchsreihen sind der besseren Uebersicht wegen in nachstehenden Tabellen niedergelegt. Nicht in dieselben aufgenommene Daten sind in diesem Bericht der einzelnen Versuchstage eingetragen. Die Eintheilung der 31 Versuchstage in 4 Perioden ergab sich, der verschiedenen Diät entsprechend, von selbst. — Die Menge der Einnahmen und Ausgaben, der Harnbestandtheile, des Zuckers etc. wurden anfangs bei gemischter (I. Periode), dann bei absoluter animalischer (II. Periode), ferner bei rein animalischer mit geringer Zufuhr von Milch (III. Periode), endlich wieder bei absoluter animalischer Kost bestimmt. (IV. Periode.)

I. Periode, 3-tägig vom 15.—17. Mai inclusive. — Gemischte Kost.

Pat. schied bis zum Beginn meiner Beobachtungen während seines Aufenthaltes in der Klinik (2.—14. Mai) bei gemischter Kost 207,9 — 876,42

Grm. in 24 Stunden aus¹⁾). Seit dem 5. Mai war Pat. ohne jegliche medicamentöse und diätetische Behandlung gewesen und konnte daher oben angegebener Untersuchungsplan sofort in Angriff genommen werden. Das Körpergewicht hatte bis zum Beginn der Untersuchung fortlaufend abgenommen.

Während dieser ersten Periode wurde die bisher genossene amylaceenreiche Nahrung allmählich durch genügenden Ersatz an animalischer Kost täglich mehr eingeschränkt, so dass Pat. am 18. Mai zur absoluten Fleischdiät übergehen konnte.

I. Versuchstag. 15.—16. Mai.

Die Nacht vom 14. auf den 15. hatte Pat. unruhig geschlafen. Er ging kurz vor 8 Uhr Morgens zu Stuhl und entleerte seine Blase soviel als möglich.

Pat. liegt fast den ganzen Tag im Halbschlaf, raucht dazwischen eine Cigarette mit grossem Wohlbehagen. Das Rauchen war Pat. bisher, da er mit anderen Kranken sein Zimmer zu theilen hatte, untersagt. Hunger- und Durstgefühl bedeutend. Temperatur im Anus um $0,3^{\circ}$ höher, als in der Achselhöhle.

II. Versuchstag. 16.—17. Mai.

Pat. fühlt sich sehr schwach, geht nur mit Mühe bis zur Wage, welche 10 Schritt vom Bett entfernt

1) Vergl. Dorpat, med. Klinik, Krankengeschichte Nr. 181, Mai 1885.

steht. Letztere wird ans Bett gestellt. Psychisch stark alterirt, weint dazwischen ohne einen Grund seiner Verstimmung anzugeben. Pat. klagt über unstillbaren Durst. Mittags guter Appetit, Gefühl der Sättigung nach der Mahlzeit. In der Nacht relativ guter Schlaf.

III. Versuchstag. 17.—18. Mai.

Brod bis auf 190 Grm. entzogen. Klage über allgemeine Schwäche und Kältegefühl, trotzdem Pat. ausser mit Hemd, Unterbeinkleidern und Schlafrock bekleidet in zwei wollene Decken gehüllt war.

II. Periode. 8tägig vom 18.—25 Mai incl. absolute Fleischdiät.

IV. Versuchstag. 18.—19. Mai.

Pat. vermisst Brod bei keiner Mahlzeit, nach demselben Gefühl vollständiger Sättigung. Die Erlaubniss dazwischen einige Cigaretten rauchen zu dürfen erhielt Pat. in guter Stimmung. Das Rauchen gestattete ich Pat., der Controlle und Sicherheit vor Feuersgefahr wegen, nur in meiner Gegenwart. Das Rauchwerk wurde unter Verschluss gehalten. Da am Tage vorher eine halbe Cigarre, welche ich auf meinem Tische liegen gelassen hatte, verschwunden war und sich einige Tabacksblätter und Cigarrenasche vor seinem Bette fanden, musste Pat. bis zu meinem Tische gegangen sein und sich sowol Zündhölzchen, als auch die

halbe Cigarre geholt haben, was bei seiner grossen Körperschwäche und angegebenen Blindheit auffällig genug erschien. Acht Uhr Abends benutzte ich die Gelegenheit, während auf dem Corridor gegangen wurde, schritt auf die Thür zu, öffnete sie, verschloss sie aber von innen, um Pat. zu beobachten. Kaum dass die Thür in's Schloss gefallen, stand Pat. auf, ging freilich sehr bedächtig und mühsam mit ausgestreckten Armen, ohne mich zu bemerken, gerade auf meinen Tisch, 10 Schritt von seinem Bett entfernt, los, den er seiner Stellung nach also schon kennen musste, die Wand dazwischen zur Orientierung betastend. Er suchte auf demselben umher, fand aber die annähernd auf derselben Stelle wie am vorhergehenden Tage befindlichen Zündhölzer und zwei Cigarren, die ich absichtlich hingelegt hatte, nicht. Pat. ging darauf zum Fenster und versuchte dasselbe zu öffnen. Seine Kräfte reichten aber nicht aus, da ich schwere Gewichte vor dasselbe gestellt hatte. Die Fenster waren ausserdem, wie oben erwähnt, vom 1. Versuchstage an versiegelt. Unverrichteter Sache ging Pat. wieder zum Bett zurück, an mir vorbei, ohne mich in einer Entfernung von 2 Schritten zu bemerken.

Diese Beobachtung legte mir ein lebhaftes Zeugnis ab von der Sorgfalt der Controlle, welche bei Beobachtung Diabeteskranker angewandt werden muss,

wenn letztere auch im jämmerlichsten Kräftezustande, blind etc. sind. Unberechenbar bleibt ihr Thun und Treiben stets. Meine Anwesenheit verschwieg ich Pat., um gelegentlich auf diese Weise, trotz seines Versprechens Nichts Unerlaubtes in meiner Abwesenheit sich zu Schulden kommen zu lassen, die meiner Ansicht nach jede Täuschung vereitelnden Vorkehrungen auf ihre Sicherheit, wie sie für vorliegende Arbeit grundbedingend war, zu prüfen, zumal Pat. strikt ableugnete, in meiner Abwesenheit das Bett verlassen zu haben.

Pat. schlief spät ein und verspürte gegen Morgen nach unruhigem Schläfe Frösteln. Stuhl bisher von breiiger Consistenz. Zum ersten Mal erfolgte Nachts ein Stuhl.

V. Versuchstag. 19.—20. Mai.

Temperatur erhöht. Spuren von Eiweiss im Harn. Zuckergehalt beträchtlich gesunken. Körpergewichtsverlust 1730 Grm. Pat. weist die Nahrung zurück und verlangt nach Milch und Brod; da ihm letzteres verweigert wurde, nahm er die ihm gebotene Nahrung zu sich. Pat. klagt über Unterleibschmerzen. Es treten reichliche Durchfälle auf. Mittags isst er mit sichtlichem Widerwillen und weist einen Theil der Nahrung, da ihm Brod verweigert wird, zurück. Nachmittags 4 Uhr fühlt Pat. sich sehr wohl, da er rauchen darf. Pat. giebt an, wenn er rauche, ge-

ringeren Durst zu verspüren. Unmittelbar darauf in demselben Momente, als ich die Thür schloss aber im Zimmer blieb — ich stellte dieselbe Beobachtung wie am Tage vorher an — trank Pat., sich unbeobachtet glaubend, eine grosse Quantität Wasser aus dem stets neben ihm befindlichen Krüge, wobei er freilich sehr sorgfältig, ohne etwas zu verschütten, verfuhr. Seine Aussagen hatten also absolut keinen Werth. Die Voraussetzung in keiner Weise auf die Aussagen des Pat. Gewicht legen zu dürfen, sondern nur die Thatsachen sprechen zu lassen, bestätigte sich aufs Neue bei jeder dieser Controllen, welche noch wiederholt angestellt wurden, der Kürze wegen aber fernerhin unerwähnt bleiben. Nachts unruhiger Schlaf, es erfolgt eine copiöse Stuhlentleerung.

VI. Versuchstag. 20.—21. Mai.

Pat. unterscheidet auf einen Fuss Entfernung mit dem rechten Auge bis zu 3 Finger, jedoch mit grosser Anstrengung. Eiweiss im Urin reichlich vorhanden. Harn nach 48 stündigem Stehen zum 1. Mal dunkelroth. Durchfälle. Tinctura opii simpl. gtt. X. In der Nacht unruhiger Schlaf, beim Erwachen Leibschmerzen.

VII. Versuchstag. 21.—22. Mai.

Es erfolgen drei flüssige Stühle. Tinct. opii gtt. X. Relatives Wohlbefinden, Appetit gut. Pat. erkennt mit dem rechten Auge schon die Anzahl von

5 Fingern. Nach kurzer Zeit ermüdet sein Auge, so dass nur die 3 ersten Angaben richtig waren. Abends guter Appetit. Pat. verlangt nach einem warmen Bade; spätes Einschlafen.

VIII. Versuchstag. 22.—23. Mai.

9 Uhr Morgens Tinct. opii gtt. X, Appetit gering. 9 $\frac{1}{2}$ Uhr Morgens nimmt Pat. in meiner Gegenwart ein warmes Bad (35° C.), welches er sehr angenehm empfindet. Vor demselben entleerte er die Blase. Pat. klagt über zunehmende Schwäche und Kälte, besonders in den Beinen, trotz warmer Bedeckung. Vier dünnflüssige Entleerungen, Faeces dünnflüssig, schleimig, Fett nicht enthalten, Eidotterreste nachweisbar. Abends 10 Uhr Tinct. opii gtt. XX.

IX. Versuchstag. 23.—24. Mai.

Pat. klagt über Leibschmerzen. Appetit gut. Durstgefühl vermindert.

X. Versuchstag. 24.—25. Mai.

Morgens 9 $\frac{1}{4}$ Uhr. Füße und Hände fühlen sich kühl an. Leibschmerzen. Calomel gr. $\frac{1}{6}$, 6 Mal tägl. Appetit gut. Bedürfniss nach Wasser gestiegen. 2 Uhr Mittags halbstündige Massage der unteren Extremitäten. Nach derselben fühlt Pat. das Bedürfniss zu schlafen. Nachdem er eine Stunde fest geschlafen, äussert er sich sehr dankbar für die »schöne Salbe« (Vaselin), welche seine Gelenke beweglicher gemacht und seinem Körper Wärme zuge-

führt habe. Pat. ist heiterer Stimmung und singt einige estnische Lieder.

XI. Versuchstag. 25.—26. Mai

Leibschmerzen geschwunden. 2 Uhr Mittags, halbstündige Massage der oberen und unteren Extremitäten. Pat. bat um dieselbe, da er sich nach ihr so wohl befinde und neben dem behaglichen Wärmegefühl eine Zunahme seiner Kräfte verspüre. Die nach der Massage auftretende Wärme vergleicht Pat. mit der in einem russischen Dampfbade. Abends 8 Uhr kann Pat. die Zahl der auf 1 Fuss Entfernung vorgehaltenen Finger die ersten sechs Mal genau angeben, wenngleich nur mit grosser Mühe Pat. sieht zum 1. Mal, dass ich einen Bart trage. Auf dieselbe Frage blieb er mir die Antwort bei der Aufnahme des Status praesens schuldig. Pat. will auch die Umrisse des Gesichts wahrnehmen können.

III. Periode. 12-tägig. 26. Mai bis 6. Juni incl. — Fleischdiät mit geringer Zufuhr von Milch.

XII. Versuchstag. 26.—27. Mai.

2 Uhr Mittags Massage, wie am vorhergehenden Tage. Leibschmerzen gering. Calomel gr. $\frac{1}{6}$, 6 Mal täglich. — Milchquantum 100 Grm.

XIII. Versuchstag. 27.—28. Mai.

Leibschmerzen geschwunden. Der Hunger wird

erst durch bedeutend grössere Portionen gestillt, als an den letzten 9 Tagen. Milch 200 Grm.

XIV. Versuchstag. 28.—29. Mai.

8 Uhr Morgens erhält. Pat. ein Bad 35 ° C. — 2 Uhr Mittags. Massage, wie bisher. Nach derselben Pat. heiterer Stimmung, er erkennt ausser dem Bart auch Nase, Haar und Mund; die Augen vermag er nicht deutlich zu sehen. Milch 400 Grm.

XV. Versuchstag. 29.—30. Mai.

Massage wie gewöhnlich, Appetit gut. Pat. greift auf 2 Fuss sicher nach dem Teller. Abends singt Pat. Soldatenlieder. Milch 400 Grm. Nachts Durchfälle, trotzdem 200 Grm. Zunahme des Körpergewichts. Zucker im Harn auch nicht in Spuren nachweisbar.

XVI. Versuchstag. 30.—31. Mai.

Leibschmerzen. 8 Uhr Morgens Tinct. opii gtt. XX. Massage. 2 Uhr Nachmittags copiose Stuhlentleerung. Milch 200 Grm.

XVII. Versuchstag. 31. Mai—1. Juni.

Durst gesteigert. Appetit geschwunden. Leibschmerzen vorhanden. Calomel gr. $\frac{1}{6}$, 3 Mal täglich.

Pat. weist Mittags Fleischnahrung zurück. Abends bemerkte er, dass man ihm seit langer Zeit kein Brod gegeben. Massage fällt aus. Milch 400 Grm.

XVIII. Versuchstag. 1.—2. Juni.

Nachmittags erkennt Pat. sowol mit dem rechten als auch mit dem linken Auge 6 Mal der Reihe nach die Zahl der vorgehaltenen Finger, auch den aufsteigenden Rauch einer Papyros. Abends 10 Uhr wachte Pat. mit einem Schrei aus dem Schläfe auf und begann heftig zu weinen. Er gab an, einen schlechten Traum gehabt zu haben, dem zufolge er sobald wie möglich in seine Heimath wolle, da er in kurzer Zeit sterben müsse. Er konnte kaum beruhigt werden, da er immer von Neuem zu weinen und zu klagen anfang. Die Nacht verbrachte er schlaflos. Die 24-stündige Harnmenge ergab einen Zuckergehalt von $0,5 \text{ ‰} = 9,2 \text{ Grm.}$ der gesammten Harnmenge.

XIX. Versuchstag. 2.—3. Juni.

Pat. noch immer verstimmt und unruhig, will durchaus in seine Heimath. Milch 400 Grm. Nachts einige Stunden fester Schlaf.

XX. Versuchstag. 3.—4. Juni.

Bedürfniss nach Wasser und Nahrung gestiegen. Massage. Nach derselben relatives Wohlbefinden. Milch 400 Grm.

XXI. Versuchstag. 4—5. Juni.

Pat. fühlt sich wohl. Extremitäten den ganzen Tag über warm. Milch 400 Grm.

XXII. Versuchstag. 5—6. Juni.

Extremitäten den ganzen Tag über warm. 10 Uhr Morgens erhält Pat. ein warmes Bad (35° C.), welches ihm sehr angenehm. Das Verlangen nach Nahrung und Wasser ist gestiegen. Pat. nimmt noch grössere Quantitäten als bisher zu sich. Massage. Stimmung darnach vorzüglich. Pat. hat wieder Hoffnung auf Genesung. Milch 300 Grm.

XXIII. Versuchstag. 6.—7. Juni.

Zuckergehalt des Harnes gestiegen. Milch 200 Grm.

IV. Periode. Achttägig vom 7—14. Juni incl.
Absolute Fleischdiät.

Pat. wurde während dieser Periode in meiner Abwesenheit von einem mir befreundeten älteren Mediciner beobachtet, so dass er keinen Augenblick im Zimmer unbeaufsichtigt blieb. Nachts wurde abwechselnd gewacht. Es kam mir wesentlich darauf an durch diese Tag und Nacht ununterbrochene fortlaufende Beobachtung, bei welcher Pat. sich gelegentlich allein glaubte, die dem Pat. bei seinen sensiblen Ausgaben eingeschärfte Sorgfalt zu constatiren, andererseits die für die Berechnung der Perspiratio insensibilis nothwendigen exacten Angaben der Harn- und Stuhlentleerungen ihrer Quantität nach sicher zu stellen.

XXIV. Versuchstag. 7.—8. Juni.

Wiederholte Beobachtung des Pat., bei welcher letzterer allein zu sein glaubte. 10 Uhr Stuhlentleerung, bei welcher Pat. mit peinlicher Sorgfalt den Harn in das dazu bestimmte Glas entleerte. Pat. entledigte sich darauf seines Schlafrockes und begann darauf sich zu streichen und zu kneten ($\frac{1}{4}$ Stunde lang), die Manipulation der Massage nachahmend. Pat. trinkt eine grössere Quantität Wasser, gleichfalls mit grosser Sorgfalt ein Ueberschütten vermeidend. Pat. geht mehrmals zur Wasserleitung, trotzdem er einen vollen Krug Wasser am Bett stehen hatte, konnte aber in Folge getroffener Vorkehrungen den Krahn nicht öffnen. Nachweisbar war sein Thun durch eine nicht zu umgehende Verschiebung eines Stuhles, welche auch sofort von mir beim Betreten des Zimmers nachgewiesen wurde. Obiger Thatbestand wurde in meiner Abwesenheit constatirt. Durstgefühl grösser. Harnmenge, Zuckerausscheidung gestiegen. Zunahme des Körpergewichts.

XXV. Versuchstag. 8.—9 Juni.

Status idem.

XXVI. Versuchstag. 9.—10. Juni.

12 Uhr Mittags erhält Pat. 2,1 Grm. Benzol¹⁾.

1) cf. Phenolbestimmung. p.

Abends singt Pat. mehrere Lieder munteren und ernststen Inhalts. Harnmenge, Zuckergehalt gestiegen.

XXVII. Versuchstag. 10.—11. Juni.

Titrirung mit Knäpp'scher Lösung.

XXVIII. Versuchstag. 11.—12. Juni.

Pat. fühlt sich wohl. Mit den Faeces geht ein Spulwurm ab. Pat. klagt über Leibschneiden, das nach dem Essen verschwindet.

XXIX. Versuchstag. 12.—13. Juni.

Pat. verlangt nach Massage, die er in letzter Zeit vermisst.

1 Uhr 25 Min. Mittags 2, grm. Benzol

1	„	25	„	—	2 Uhr 25 Min. Mittags	} Massage des ganzen Körpers mit Ausnahme des Unterleibes.
7	„	30	„	—	8 „ 30 „ Abends	
1	„	—	„	—	2 „ — „ Nachts	

Nachts fester Schlaf.

XXX. Versuchstag. 13.—14. Juni.

8—9	Uhr Morgens	} Massage des ganzen Körpers mit Ausnahme des Unterleibes.
2—3	„ Nachmittags	

Pat. fühlt sich sehr wohl. Nachmittags erquickender Schlaf. Pat. ist soweit gekräftigt, dass er 25 Minuten im Zimmer auf und ab gehen kann. Körpergewichtszunahme.

XXXI. Versuchstag. 14.—15. Juni.

Brod vermisste Pat. bisher nicht, behauptet bei dieser Diät noch lange aushalten zu können, da er

sich bedeutend kräftiger fühle, die Zufuhr müsse nur dieselbe bleiben. Durst bedeutend gestiegen. Körpergewicht hat zugenommen. Sehvermögen des Pat. schlechter geworden, er vermag nicht einmal die Zahl der vorgehaltenen Finger anzugeben.

V.

Die Resultate der täglichen Untersuchungen sind der besseren Uebersicht wegen in folgenden Tabellen niedergelegt.

Tabelle A.

Uebersicht über die täg

Datum 18 5 Mai.	Morgens 8 Uhr.								Mitt		
	Milch.	Fisch.	Brod.	Butter.	Eier.	Speck.	Fleisch.	Bouillon.	Fleisch.	Grütze.	Suppen.
15—16	275	—	230	—	—	—	—	—	105	602	—
16—17	290	—	175	—	—	—	—	—	159	—	739
17—18	576	—	75	12	74	—	—	—	195	—	494
18—19	—	—	—	—	120	75	138	—	203	—	—
19—20	—	—	—	—	120	50	74	—	143	—	—
20—21	—	215	—	—	120	27	112	—	108	—	—
21—22	—	215	—	—	110	22	—	—	—	—	—
22—23	—	52	—	—	119	—	—	—	115	—	—
23—24	—	—	—	—	110	—	25	—	320	—	—
24—25	—	—	—	—	120	—	205	—	108	—	—
25—26	—	—	—	—	120	—	205	—	108	—	—
26—27	100	—	—	—	120	—	205	—	108	—	—
27—28	100	—	—	—	120	—	205	—	120	—	—
28—29	200	—	—	—	115	—	250	—	110	—	—
29—30	200	—	—	—	120	—	221	—	105	—	—
30—31	200	—	—	—	120	—	115	—	—	—	—
31— 1 VI	—	—	—	—	120	—	—	—	—	—	—
1— 2	200	—	—	—	120	—	211	—	—	—	—
2— 3	200	—	—	—	—	—	—	—	106	—	—
3— 4	200	151	—	—	—	—	215	—	215	—	—
4— 5	200	—	—	—	75	—	326	—	216	—	—
5— 6	200	—	—	—	120	—	632	—	211	—	—
6— 7	200	276	—	—	120	—	216	—	666	—	—
7— 8	—	276	—	—	75	—	326	201	366	—	—
8— 9	—	170	—	—	75	—	396	315	261	—	—
9—10	—	210	—	—	120	—	320	520	210	—	—
10—11	—	210	—	—	120	—	320	520	210	—	—
11—12	—	210	—	—	120	—	320	520	210	—	—
12—13	—	210	—	—	120	—	320	520	210	—	—
13—14	—	210	—	—	120	—	320	520	210	—	—
14—15	—	210	—	—	120	—	320	520	210	—	—

15—18. Mai I. Periode (Gemischte Kost.)

18—26. „ II. Periode. (Fleischdiät).

26. Mai—7. Juni III. Periode (Fleischdiät mit geringer Zufuhr von M.

7—15 Juni IV. Periode (Fleischdiät.)

ingszufuhr in Grms.

	A b e n d s 6 U h r.							Summe d. Einnahmen.		Gesamt- einnahme.
Bouillon.	Milch.	Brod.	Eier.	Bouillon.	Speck.	Fleisch.	Fisch.	Wasser in 24 St.	Nahrung in 24 St.	
—	300	350	—	—	—	—	—	1867	2062	3929
—	603	110	74	—	—	—	—	595	2375	2970
—	607	50	70	—	—	—	—	1533	2218	3751
0	—	—	120	—	59	210	205	1825	1376	3201
—	—	—	120	—	—	210	170	1440	1023	2463
6	—	—	115	—	—	120	205	2418	1391	3809
9	619	—	117	—	—	55	307	1830	1695	3525
6	674	—	110	—	—	25	197	1890	1652	3542
2	439	—	75	—	—	275	90	559	1611	2170
0	518	—	75	—	—	362	—	1328	1648	2976
0	518	—	75	—	—	362	—	816	1648	2464
1	518	—	145	—	—	362	—	600	1818	2418
3	450	100	110	—	—	318	120	770	2044	2814
3	520	200	120	—	—	456	—	690	2344	3034
3	550	200	120	—	—	340	—	800	2227	3027
1	350	—	75	—	—	346	—	800	1712	2512
6	—	200	75	—	—	—	130	1000	1141	2141
1	—	200	75	—	—	—	276	1250	1548	2798
6	320	—	75	—	—	381	—	740	1688	2428
3	350	200	120	—	—	350	221	1460	2398	3858
6	355	200	—	440	—	376	126	1000	2665	3665
3	641	100	—	—	—	522	236	1500	3023	4523
—	—	—	75	425	—	356	296	1500	2630	4130
6	710	—	75	405	—	326	216	2000	3242	5242
1	792	—	40	460	—	325	241	1500	3441	4941
0	740	—	75	375	—	625	322	1050	3892	4942
0	740	—	75	375	—	625	322	1500	3892	5392
0	740	—	75	375	—	625	167	1500	3737	5237
0	740	—	75	375	—	625	322	1500	3892	5392
0	740	—	75	375	—	625	322	1500	3892	5392
0	740	—	75	375	—	625	322	2335	3892	6227

Tabelle B. a.

Uebersicht über die tä

Datum. Mai 1885.	Tageszeit.		Farbe.	Consis
15—16	8 Uhr	Morgens	braun	bre
	3	» Nachmitt.	braun	»
16—17	8	» Morgens	»	»
	3	» Nachmitt.	»	»
17—18	10	» Morgens	»	»
18—19	8	» Morgens	»	»
	3	» Nachts	»	»
19—20	8 $\frac{1}{2}$	» Morgens	hellbraun	dickfl
	1	» Nachmitt.	braun	dünnf
	3	» Nachts	hellbraun	»
20—21	8	» Abends	braun	»
	4	» Nachts	»	»
21—22	9 $\frac{1}{4}$	» Morgens	»	»
	7	» Abends	»	»
	4	» Nachts	»	»
22—23	11	» Morgens	»	»
	3	» Nachmitt.	»	»
	11 $\frac{1}{2}$	» Abends	hellbraun	»
	5	» Morgens	»	»
23—24	12	» Mittags	grünlich	»
	6	» Abends	hellbraun	»
	8	» Abends	»	»
	6	» Morgens	»	»
24—25	12	» Mittags	»	»
	6	» Abends	»	»
	4	» Morgens	braun	»
25—26	4	» Nachmitt.	hellbraun	»
	6	» Morgens	dunkel	»
26—27	12	» Mittags	hellbraun	»
	4	» Morgens	»	»
27—28	6	» Abends	»	»
	7	» Morgens	»	»
28—29	3	» Mittags	braun	»
	6	» Abends	»	»
	12	» Nachts	»	»
	6 $\frac{1}{9}$	» Morgens	»	»

ten Stuhlentleerungen.

nach.	Gewicht und jedesmalige Entleerung in Grm.	24 stündige Faecalmasse in Grm.	Anormale Bestandtheile der Faeces.	Periode.
faecal	173	456	—	I
	283		—	
	166		—	
r	388	554	—	
	433	433	—	
	303	503	—	II
	200		—	
	488		—	
	205	1076	—	
	383	455	—	
	168		—	
	267		—	
	160	495	Schleim	
	135		—	
	200		—	
	135	631	Schleim	
	115		Eidotterreste	
	190		—	
	191	542	Schleim	
	75		Spuren von	
	105		Blut	
	200	453	—	
	162		—	
	115		Schleim	
	163	340	Eidotterreste	
	175		—	
	110		stark schleimig	
	230	255	—	III
	65		—	
	190		—	
	115	415	—	
	300	548	—	
	60		—	
	150		—	
	200		—	
	138		—	

Tabelle B. b.

Uebersicht über die ta

Datum. Mai 1885.	Tageszeit.	Farbe.	Consi
29—30	6 Uhr Abends	hellbraun	dünnt
	3 » Nachts	»	»
	7 $\frac{1}{2}$ » Morgens	»	»
30—31	1 » Nachts	»	dickf
	6 » Morgens	»	»
31. Mai	2 » Mittags	braun	dünnt
bis 1. Juni	5 » Morgens	graubraun	bre
1—2	11 » Morgens	»	dünnt
	3 » Morgens	»	bre
2—3	3 » Nachmitt.	braun	dünnt
	5 » Morgens	»	»
3—4	6 » Morgens	»	bre
4—5	10 » Morgens	»	»
	3 » Nachts	»	»
5—6	5 » Morgens	»	»
6—7	3 » Nachmitt.	»	dickf
	1 $\frac{1}{2}$ » Nachts	»	»
7—8	12 » Mittags	»	»
	6 » Abends	»	dünnt
	5 » Morgens	»	bre
8—9	12 » Mittags	»	»
	2 » Nachts	»	»
9—10	12 » Nachts	»	»
10—11	9 » Morgens	»	»
	3 » Nachmitt.	»	»
	12 » Nachts	»	»
11—12	11 » Vormitt.	»	dickf
	6 » Abends	»	»
	12 » Nachts	»	bre
12—13	10 » Vormitt.	»	»
	3 $\frac{1}{4}$ » Nachts	»	»
13—14	10 $\frac{1}{2}$ » Vormitt.	»	»
	2 $\frac{1}{4}$ » Nachts	»	»
14—15	9 » Morgens	»	»
	1 $\frac{1}{2}$ » Nachts	»	»

ten Stuhlentleerungen.

u c h.	Gewicht der jedesmaligen Entleerung in Grm.	24 stündige Faecalmasse in Grm.	Anormale Bestandtheile der Faeces.	Periode.
faecal	98	526		III
»	217			
»	211	378,5		
»	200,5			
»	178	301		
»	68			
»	233	383		
»	75			
»	308	438		
»	130			
»	308	265		
»	265			
»	140	310		
»	170			
»	368	368		
»	150			
»	300	450		
»	110			etwas schleimig
»	130	518		
»	278			schleimig
»	120	280		
»	160			300
»	300	410		
»	90			468
»	100	1 Spulwurm	IV	
»	220			Microsk. Fettkryst.
»	110	Fettkrystalle.		
»	100			256
»	258	555		
»	201			259
»	55			
»	200			
»	355			
»	105			
»	154			

Tabelle C.

Resultate der täg

Datum. Mai 1885.	Reaction.	Farbe u. Durchsich- tigkeit.	Microskp. Befunde.	Eiweiss.	Eisenchlorid Reaction.
15—16	sauer	Blassgelb, schillert ins Grünliche, klar; nach einigen Stunden stets trübe.	Harnsäure	—	neg.
16—17	»		Krystalle.	—	»
17—18	»		»	—	»
18—19	»		»	—	»
19—20	»		»	Spuren	»
20—21	»		Harnsäure	reichlich	»
21—22	»		»	»	»
22—23	»		»	»	»
23—24	schw. sauer		Cylinder	»	»
24—25	sauer		Harnsäure	»	»
25—26	»		»	»	»
26—27	»		»	»	»
27—28	»		»	»	»
28—29	»		»	»	»
29—30	»		»	»	»
30—31	»		»	»	»
31 V. — 1 VI.	»		»	»	»
1—2	»		»	»	»
2—3	»		»	»	»
3—4	»		»	»	»
4—5	»		»	»	»
5—6	»		»	»	»
6—7	»		»	schwer fällbar durch Kochen	»
7—8	»		»	»	»
8—9	»		»	} durch Kochen nicht fällbar, d. Bleiessig gefällt	»
9—10	»		»		»
10—11	»		»		»
11—12	»		»	d. Kochen fällb.	»
12—13	»		»	} durch Kochen nicht fällbar	»
13—14	»		»		»
14—15	»		»		»
				fällb. d. Kochen	»

untersuchung.

Nacht-Ur. 8 U. A. bis 8 U. M.	Gesamnte Harn- menge		Zucker %		Zucker in Grm.	Periode.
	CC.	Grm.	durch Titrirung	durch Polarisat.		
1500	3192	3326	8,3	+ 8,9	284,088	I
955	2100	2186,1	7,14	+ 7,6	159,6	
1270	2650	2737,5	4,4	+ 4,9	129,85	
1650	2645	2727	2,5	+ 2,6	68,77	II
1405	2250	2315,2	1,6	+ 1,5	33,75	
2200	3190	3282,5	1,25	+ 1,7	54,23	
1510	2150	2205,9	0,67	+ 0,8	17,2	
1135	1935	1985,3	0	+ 0,3	5,805	
850	1355	1391,6	0	0	—	
705	1535	1574,9	0	— 0,1	—	
695	1485	1523,6	0	— 0,2	—	
775	1575	1614,4	0	— 0,2	—	III
775	1775	1821,2	0	— 0,1	—	
805	1670	1716,8	0	0	—	
900	1670	1716,8	0	— 0,1	—	
1080	1755	1802,4	0	— 0,1	—	
675	1125	1156,5	0	— 0,5	—	
1140	1840	1893,4	—	+ 0,5	9,2	
915	1495	1536,9	—	+ 0,3	4,485	
1835	3255	3346,1	—	+ 1,8	58,59	
1525	2560	2639,4	—	+ 2,0	51,2	
2175	3925	4042,8	—	+ 1,7	66,725	IV
2140	2940	3031,1	—	+ 2,7	79,38	
2475	3990	4105,7	—	+ 2,8	111,72	
2430	3830	3937,2	—	+ 1,6	61,28	
2265	4065	4178,8	—	+ 2,0	81,3	
2465	4275	4399	—	+ 2,1	89,775	
2275	3965	4080	—	+ 1,9	75,335	
2500	4360	4482,1	—	+ 1,6	69,76	
2205	3935	4045,2	—	+ 1,7	66,895	
2060	3850	3957,8	—	+ 1,7	65,45	

$$47290 = 82342$$

Tabelle D.

Uebersicht über täg

Datum Mai 1885.	Temperatur		Puls- frequenz.		Absolut. Körper- gewicht in Gr.	Behandl
	Morg.	Abds.	Morg.	Abds.		
15—16	36,5	37,7	76	80	45600	—
16—17	36,2	37,6	73	70	45460	—
17—18	36,6	37,2	80	66	44760	—
18—19	36,8	37,8	94	74	44520	—
19—20	37,5	38,0	78	74	43500	Leibbinde
20—21	37,8	38,2	74	110	41770	Tinct. opii sp
21—22	37,6	37,8	80	110	41650	» g
22—23	37,4	37,7	78	72	41650	» g
23—24	37,4	38,0	80	82	42000	1 warm. Bac
24—25	37,9	37,9	80	80	41550	Colomel gr. 1
25—26	37,4	37,6	84	92	41700	»
26—27	37,2	38,0	94	84	41600	»
27—28	37,0	38,5	74	120	41450	—
28—29	38,0	38,5	88	96	41250	1 warm. Bac
29—30	38,0	38,8	88	96	41250	—
30—31	38,7	38,9	92	92	41450	Tinct. opii sp
31 V—1 VI	38,2	38,2	84	104	41200	Colomel gr. 1
1—2	38,0	38,5	92	90	41500	» »
2—3	38,1	38,5	96	100	41650	—
3—4	38,3	38,5	84	80	41300	—
4—5	38,1	38,0	88	100	41400	—
5—6	37,6	38,4	80	90	41400	1 warm. Bac
6—7	37,8	38,6	84	96	40750	—
7—8	37,3	38,3	80	82	40970	—
8—9	37,0	38,0	64	80	41150	—
9—10	37,1	37,9	72	96	41250	—
10—11	37,0	38,2	68	100	41300	—
11—12	37,2	38,2	68	96	41200	—
12—13	37,3	37,9	64	86	41300	—
13—14	37,5	37,9	80	88	41600	—
14—15	37,5	37,9	80	84	41500	—
15—16	37,2	—	63	—	42800	—

ergewicht etc. etc.

sage mittags.	Temper. d. Extremit.		Tempera- tur der Haut.	Bemerkun- gen.	Periode.
	Morgs. 8 U.	Abds. 8 U.			
	kühl	kühl	Die Haut des Körpers mit Ausnahme der Extremitäten fühlte sich stets warm an. Ueber Frösteln klagt Pat. seit dem 25./V nicht mehr.		I
	»	»			
	»	»			II
	»	»			
	»	»			
en u. unterem. $\frac{1}{2}$ St.	»	warm			
»	warm	»			III
»	kühl	»			
»	»	»			
»	warm	»			
»	»	»			
»	»	kühl			
ter. Extr. $\frac{1}{2}$ St.	kühl	warm			
»	warm	kühl			
er. Extr. $\frac{1}{2}$ St.	kühl	warm			IV
»	warm	»			
er. Extr. $\frac{1}{2}$ St.	»	»			
»	»	»			
»	»	»			
»	»	»			
»	warm	kühl		Benzol 2,1 innerl.	
Körpers	kühl	warm			
»	warm	»		Benzol 2,0 innerl.	
»	»	»			
»	»	»			
»	»	»			

Tabelle E.

Datum.	Pat. nahm zu sich		Tägliche Harn- menge in Grm.	Tägliche Zuckerausschei- dung in Grm.	Gesamtein- nahme in Grm.	Gesamtaus- gabe in Grm.
	an flüssiger Nahrung und Wasser in Grm.	an fester Nahrung in Grm.				
15--16 Mai	3044	885	3326	284,088	3929	3782
16--17 "	2227	743	2186,1	159,6	2970	2740,1
17--18 "	3210	541	2737,5	129,85	3751	3170,5
18--19 "	1825	1376	2727	68,77	3201	3230
19--20 "	1440	1023	2315,2	33,75	2463	3391,3
20--21 "	2418	1391	3282,5	54,23	3809	3717,5
21--22 "	2449	1076	2205,9	17,2	3525	2700,9
22--23 "	2564	978	1985,3	5,805	3542	2616,3
23--24 "	998	1172	1391,6	0	2170	1933,6
24--25 "	1846	1130	1574,9	0	2976	2027,9
25--26 "	1334	1130	1523,6	0	2464	1863,6
26--27 "	1218	1200	1614,4	0	2418	1869,4
27--28 "	1420	1394	1821,2	0	2814	2236,2
28--29 "	1610	1424	1716,8	0	3034	2264,8
29--30 "	1750	1277	1716,8	0	3027	2242,8
30--31 "	1350	1162	1802,4	0	2512	2180,9
31. Mai—1. Juni	1400	741	1156,5	0	2141	1457,5
1—2 Juni	1650	1148	1893,4	9,2	2798	2276,4
2—3 "	1460	968	1536,9	4,485	2428	1974,9
3—4 "	2210	1648	3346,1	58,59	3858	3611,1
4—5 "	2195	1470	2639,4	51,2	3665	2949,4
5—6 "	2441	2082	4042,8	66,725	4523	4410,8
6—7 "	2125	2005	3031,1	79,38	4130	3481,1
7—8 "	3316	1926	4105,7	111,72	5242	4623,7
8—9 "	3067	1874	3937,2	61,28	4941	4217,2
9—10 "	2685	2257	4178,8	81,3	4942	4478,8
10—11 "	3135	2257	4399	89,775	5392	4809
11—12 "	3135	2102	4080	75,335	5237	4548
12—13 "	3135	2257	4482,1	69,76	5392	4738,1
13—14 "	3135	2257	4045,2	66,895	5392	4600,2
14—15 "	3970	2257	3957,8	65,45	6227	4216,8

VI.

Besprechung der Untersuchungsbefunde.

Die vom ersten Tage an vielleicht manchem zu detaillirt erschienenen Vorsichtsmassregeln zur Isolirung des Pat. waren trotz des colossalen Schwächezustandes und aller Versprechungen seinerseits durchaus indicirt, wie sich aus den oben angeführten Beobachtungen, bei welchen Pat. allein zu sein glaubte, ergibt.

Es kann nicht genugsam betont werden, sich davor zu hüten Diabetikern zu grosses Vertrauen zu schenken, wenn es sich um wissenschaftliche Beobachtungen handelt. Engelmann macht in der Arbeit von Külz¹⁾ mit Recht darauf aufmerksam, dass diabetische Patienten meist eine grosse Neigung hätten den Beobachter zu täuschen. Die vorliegende Beobachtung musste gleichfalls bestätigen, dass Täuschungen mannigfaltigster Art trotz bester Pflege, die dem Pat. geboten wurde, trotz der Androhung

1) E. Külz, Beiträge zur Pathologie und Therapie des Diabetes mellitus und insipidus Bd. 2. p. 33.

sofortiger Entlassung bei Entdeckung absichtlicher Täuschung, möglich gewesen wären, wenn nicht mit der grössten Scepsis den Versprechungen und Angaben des Pat. entgegengetreten worden wäre. Da sich aber die angewandten Vorsichtsmassregeln gegen absichtliche und unabsichtliche Täuschungen von Seiten des Pat. als zuverlässig bewährten, konnten vom ersten Tage an die Beobachtungsergebnisse veröffentlicht werden. Pat. eignete sich sehr gut zu den vorgenommenen Untersuchungen, da keine örtlichen Organleiden, wie Nephritis, Phthisis, Hautkrankheiten vorhanden waren, und Pat. vor Beginn der Beobachtung ohne medicamentöse und diätetische Behandlung, wenigstens in den letzten 8 Tagen, gewesen war, also ein brauchbares Untersuchungsobject abgab.

Es handelt sich um einen Fall von Diabetes mellitus, über dessen Entstehung die Angaben des Pat. wol nicht zur Erklärung der eigentlichen Krankheitsursache ausreichen dürften. Mir scheint es unmöglich eine so tiefgreifende Alteration des Stoffwechsels, wie sie bei Diabetes mellitus vorliegt, in Causalnexus mit so geringfügigen, von den Patienten gewöhnlich angegebenen, ursächlichen Momenten zu bringen, wie im vorliegenden Falle eine einmalige, körperliche Ueberanstrengung diese räthselhafte Krank-

heit mit all' ihren quälenden Symptomen erzeugt haben sollte.

Wenn wir auch wissen, dass dergleichen Fälle vorkommen, wo Schreck, Trauma, geistige und körperliche Ueberanstrengung etc. die Entstehung eines Diabetes mellitus bedingen können, so ist mir der Ausbruch der Krankheit auf die manchmal so geringfügigen angegebenen Ursachen, welche bei Tausenden von Menschen dann auch dieselbe Krankheit erzeugen müssten, ohne vorhandene, angeborene oder erworbene Disposition, geschweige denn ohne längeres unbeachtetes Bestehen der Krankheit undenkbar, zumal Frerichs¹⁾ in seiner glänzenden Abhandlung über den Diabetes mellitus anführt, »dass es Formen gebe, welche Jahre lang verborgen bleiben, weil die gewöhnlichen Zufälle fehlen, oder anderweitige Störungen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und von den wichtigen Veränderungen des Stoffwechsels ablenken.«

Dass auch Erblichkeit in einer grossen Anzahl von Diabetesfällen als disponirendes Moment nachweisbar ist, dafür sprechen die vielfachen Angaben in der Literatur von Senator, Seegen, Frerichs, Cantani, Pavy und vielen And. — Senator²⁾ berich-

1) Frerichs: Ueber den Diabetes, p. 190. Berlin 1884.

2) Ziemssen, Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie Bd. 13. 2. p. 121.

tet über eine Beobachtung Isenflaums, nach dessen Angabe in einer Familie alle acht Kinder von scheinbar ganz gesunden Eltern, sowie sie das achte, oder neunte Jahr erreicht hatten, an Diabetes zu Grunde gingen. Es ist aus den vielfachen Angaben, die sich immermehr in der Literatur gehäuft haben, eine Disposition für Diabetes, sei sie ererbt, oder erworben, wol sicher anzunehmen. Wären wir nur erst über die ersten Anfänge der Diabeteserkrankung besser orientirt, der eigentlichen Entstehungsursache ständen wir näher, deren Bekämpfung dankbarere Resultate liefern müsste, als die heutzutage so vielfach variirten Behandlungsmethoden erreichen, mit welchen gegen diese meist schon hochgradig vorgeschrittene Alteration des Stoffwechsels zu Felde gezogen wird.

Seit dem Anfange unseres Jahrhunderts, wo die Chemie in der Medicin mehr in Anwendung gezogen wurde, kam mehr Klarheit in die Lösung dieser Stoffwechselfrage. Die Harnanalysen gaben mehr Aufklärung, bereicherten die spärliche Casuistik und vervollständigten oder verwirrten auch zum Theil die Symptomatologie. Obenan unter den Behandlungsmethoden steht die bekanntlich seit Rollo's¹⁾ Empfehlung durch Bouchardat's²⁾ treffliche Arbeiten unterstützt, eingeführte absolute Fleischdiät, welche

1) J. Rollo. On diabetes mellitus. London 1787.

2) Bouchardat: Gaz. méd. 1835. Nr. 11.

auch bei dem vorliegenden Falle in Anwendung gezogen wurde, von der Ansicht ausgehend, vermitteltst Durchführung dieser streng diätetischen Behandlung allein dem Pat. schon wesentlich genützt zu haben, andererseits aber wissenschaftliche Beobachtungen nicht durch Ineinandergreifen diätetischer und medicamentöser Behandlung in der Deutung der Erfolge schwankend zu machen.

Leider musste gelegentlich ein medicamentöser Eingriff aus andern Gründen aufgenommen werden, wie die Behandlung der dünnflüssigen Stuhlentleerungen durch Opium, Calomel etc. Es handelte sich aber immer nur um einzelne kleine Gaben, welche die Beobachtung nicht wesentlich störten. Der besseren Uebersicht wegen wurden, wie oben erwähnt, die 31 Versuchstage in 4 Perioden getheilt, welche, wenn dienlich, isolirt, resp. gemeinsam besprochen werden sollen.

In der I. Periode, einer dreitägigen Versuchsreihe, wurde Pat. mit jedem Tage mehr von der amylaceenreichen Nahrung entzogen, um an deren Stelle Fleischspeisen und Eier zu setzen. Das in fester Form aufgenommene Nahrungsquantum, ohne dass Pat. in der Befriedigung seines Appetits beeinträchtigt wurde, ging von 885 auf 541 grm. pr. Tag herunter, dabei sank die Zuckermenge im Harn, sei es nun durch die geringere Nahrungszufuhr oder die

eingeschränkte amylaceenreiche Kost von 284,088 gm. auf 129,85 gm. Das specif. Gew. des Harns fiel von 1,042 auf 1,033, die 24 stündige Harnmenge von 3326 auf 2737,5 gm.

Das Durstgefühl war während dieser Periode stark ausgeprägt¹⁾. Während der ganzen 31-tägigen Versuchsreihe wurde Pat. stets soviel Wasser gereicht, als er zur Stillung seines Durstes bedurfte, da man, ehe man dem Pat. die Wasserzufuhr schmälert, das Verlangen der Diabetiker nach Wasser zu vermindern suchen müsste, was vielleicht durch Fortschaffung des im Blute enthaltenen Zuckers, wodurch die Dichtigkeit des Blutes vermindert wird, erreicht werden könnte.

Das Körpergewicht nahm vom 15.—17. Mai um 840 gm. ab.

Nach dieser Uebergangsperiode, während welcher Pat. stark heruntergekommen war, wurde letzterer vom 18.—25. Mai (II. Periode) auf absolute Fleischdiät gesetzt. Dieselbe liess sich ohne jede Schwierigkeit durchführen. Pat. verlangte nur einmal (19. Mai) energisch nach Milch und Brod. Die täglich in fester Form aufgenommene Nahrung (978—1391

1) Die Tabelle über die Wasseraufnahme weist starke Schwankungen auf (500—3000 gm. tägl.). Man vergl. Tabelle A und E, aus welchen auch neben dem tägl. Wasserquantum die in flüssiger Form aufgenommene Nahrung ersichtlich ist.

gm.) war vom ersten Tage dieser Periode an im Vergleich zu der der ersten (Maximum 885 gm.) eine bedeutend höhere. Der Durst hatte aber mit dem ersten Tage nachgelassen, dem auch die geringere Flüssigkeitsaufnahme entspricht (Tabelle: E). Die 24 stündige Zuckermenge sank am ersten Tage unter der absoluten Fleischdiät von 129,85 auf 68,77 gm., um am fünften Tage (22. Mai) vollständig aus dem Harne zu verschwinden. Das spec. Gew. des Urins sank annähernd parallel der geringeren Zuckerausscheidung und mit dem verschwinden des Zuckers schwand auch das Durstgefühl. Die 24 stündige Harnmenge ging dem entsprechend herunter.

Die amylaceenarme Nahrung nahm Pat. ohne Widerwillen zu sich. Gegen Fette und Salze zeigte er eine grosse Aversion, so dass die vom 18. bis zum 21. Mai neben der absoluten Fleischkost nach den Empfehlungen von Cantani¹⁾ gereichten Portionen Speck weiterhin eingestellt werden mussten. Der Leberthran, wie er häufig in Anwendung gezogen und sogar als Heilmittel gerühmt worden ist²⁾, konnte aus demselben Grunde nicht angewandt werden.

Vom 19. bis zum 30. Mai traten dünne Stühle auf, welche durch Tinct. opii simpl. am 30. Mai be-

1) Cantani: Diabetes mellitus. p. 370.

2) Salomon, med. Central-Ztg. 1857.

seitigt waren. Das Körpergewicht fiel scheinbar nach den Opiumgaben um ein Bedeutendes weniger, stieg resp. auch einmal um 350 Grm. (22. Mai); dafür waren aber sowol die Gesamteinnahmen an jenen Tagen grösser, die Gesamtausgaben, resp. auch die der Faeces bedeutend gesunken. Eine Verminderung des Durstes und Heisshungers liess sich bei unserem Pat. aber erst nach 20 Tropfen Opium, wie weiter unten berichtet, nachweisen, wie Kratschmer und Pavy Aehnliches nach Opium beobachtet haben.

Wenn das Körpergewicht in der zweiten Periode nicht mehr in so hohem Grade sank, so führe ich das mehr auf die grössere Nahrungszufuhr und die an Quantität geringeren Harn- und Stuhlentleerungen zurück, zumal über die räthselhafte Wirkung des Opiums auf das Körpergewicht nur bei gleichbleibender Diät vor und nach der Darreichung des Opiums ein Aufschluss gewonnen werden könnte. Schlüsse in dieser Richtung zu ziehen waren daher unstatthaft. Die relativ geringe Abnahme des Körpergewichts während der zweiten Hälfte der zweiten Periode dürfte daher eher der kräftigen Fleischdiät als den geringen Dosen Opium zugeschrieben werden.

Wenngleich Cantani) in seinem Werke über

1) Cantani, Diabetes mellitus, p. 385.

Diabetes mellitus sagt: der Diabetiker muss nur soviel Albuminate und Fette verdauen und assimilieren, als möglich, welchen Zweck man leichter erreicht, je weniger man von jenen Substanzen einführt, : so giebt er doch andererseits auch an¹⁾, wenn die Wage eine beträchtliche Abnahme des Körpergewichts zeige, die Quantität der Nahrung zu vermehren. 500—600 Grm. Fleisch, welche nach Cantani's Angabe für den Haushalt eines Diabetikers genügen sollen, reichten bei vorliegendem Falle keineswegs aus, um die grosse Abnahme des Körpergewichts zurückzuhalten. Erst mehr als die dreifache Nahrungszufuhr vermochte Pat. von der stark weiterschreitenden Abmagerung zu bewahren. Ein Blick auf die Tabelle *E*, resp. *A* und *D* illustriert diese Ergebnisse.

Die aufgenommene Wassermenge am 23. und 25. Mai (Tabelle *A*) fällt besonders auf. Pat. hat aber in flüssiger Form bedeutend mehr Nahrung zu sich genommen, so dass der scheinbar geringe Wasserbedarf reichlich gedeckt wurde. Am 23. Mai hatte Pat. neben der geringen Wasseraufnahme auch wenig Nahrung in flüssiger Form zu sich genommen. Am Abend vorher (22. Mai) hatte Pat. freilich 20 Tropfen Opiumtinctur seiner Durchfälle wegen eingenommen.

1) Cantani, Diabetes mellitus, p. 427.

Die dritte Versuchsreihe wurde am 3. Mai damit begonnen, Pat. neben der absoluten Fleischdiät geringe Mengen von Milch zuzuführen, um die Toleranz seines Körpers gegen diese Anwendung der Diät zu constatiren. Es ist aus theoretischen Gründen nicht ersichtlich, warum Diabetikern der leichten Form nicht auch Kohlehydrate zugeführt werden können, wenn sie dieselben zu assimiliren im Stande sind, zumal die im Fleische enthaltenen Kohlehydrate ohne Gefahr von Zuckerkranken erster Form vertragen und im Körper assimiliert werden, ohne auch nur Spuren von Zucker im Harn erscheinen zu lassen. «Bei der leichten Form des Diabetes, sagt Seegen¹⁾, kann bei reichlicher Fleischnahrung eine mässige Zufuhr von Kohlehydraten ohne grossen Nachtheil gestattet werden. Diese Zufuhr darf um so grösser sein, wenn noch eine gewisse Toleranz des Organismus für ähnliche Nahrung vorhanden ist, d. h. wenn nicht alle von Aussen zugeführten Kohlehydrate in Zucker umgewandelt werden». Vom practischen Standpunkte aus ist es jedenfalls erwünscht den Pat. soviel, als sie noch zu assimiliren im Stande sind, kohlehydratreiche Kost zu gestatten, da die Durchführung absoluter Fleischdiät auf längere Zeit unmöglich und jedem Diabetiker

1) Seegen: Der Diabetet mellitus. p. 165. p. 168. Berlin 1875.

unerträglich wird, andererseits aber Magen und Darmkatarrh derselben nur zu bald die Grenzen stecken. Es handelt sich aber immer um den Versuch, wieviel Kohlehydrate im einzelnen Falle ohne Nachtheil aufgenommen werden können. In vielen Fällen von Diabetes ist noch eine gewisse Toleranz den Kohlehydraten gegenüber vorhanden, wie auch unsere Beobachtung beweist, zumal Külz in seinen Versuchen berichtet, dass Diabetiker Milchzucker zu assimiliren gelegentlich im Stande wären. Seegen¹⁾ führt dagegen an, dass nach seinen Beobachtungen auf Milchzufuhr, je nach der Assimilationsfähigkeit der Diabetiker für Kohlehydrate, die Zuckerausscheidung zunehme. Die unsrige Beobachtung beweist jedenfalls, dass Pat. 400 Grm. Milch wenigstens eine Zeitlang noch sehr gut zu assimiliren im Stande war (cf. Tabelle: C).

Da Pat. die ersten 6 Tage (26.—31. Mai) die Milch vertrug, wurde dieselbe auch weiterhin gestattet. Es trat jedoch am 1. Juni Zucker im Harn auf. In der Nacht vom 1. auf den 2. Juni hatte Pat., wie oben schon angegeben, einen schlechten Traum, der ihn in grosse Aufregung versetzte. In der von diesem Tage gesammelten Harnmenge trat eine nachweisbare Zuckermenge auf, um in den folgenden

1) Seegen: Der Diabetes mellitus. p. 169.

Tagen, während die Milchzufuhr verringert wurde, noch erheblich zu steigen. Trotz der am 7. Juni wieder aufgenommenen absoluten Fleischdiät (4. Periode) stieg die Zuckermenge am ersten Tage noch um eine beträchtliche Menge, fast um das Doppelte, und konnte unter dieser fortgesetzten Diät nicht wieder eingeschränkt, geschweige denn zum Schwinden gebracht werden.

Bis zum letzten Versuchstage war stets Alles versiegelt. Während der letzten Periode wurde Pat. sogar Tag und Nacht, wie oben erwähnt, keinen Augenblick unbeobachtet gelassen. Harnmenge, specif. Gew. stiegen. Durst und Heisshunger traten wieder in höherem Grade auf. Dem entsprechend nahm Pat. grössere Menge Nahrung zu sich. Das Körpergewicht nahm während der letzten Periode zu.

Versuchen wir nun, nachdem wir einen Ueberblick über die vier Perioden gegeben, die einzelnen Versuchsscolonnen, soviel es eben möglich und statthaft, einer Deutung zu unterziehen.

Das Allgemeinbefinden des Pat. war während der absoluten Fleischdiät bedeutend gebessert. Pat. wurde so freundlich als möglich behandelt und erhielt die bestmögliche Krankenpflege. Das Rauchen einer Cigarre resp. Pfeife oder Cigarette versetzte ihn stets in eine heitere Stimmung. Am 22. Mai klagte Pat. noch über immer zunehmende Schwäche und

andauerndes Kältegefühl in den Beinen. Die psychische Depression, unter welcher er die erste Zeit stand, hob sich allmählig und war vom 24. Mai an, seit welchem Tage Pat. massirt wurde, in seiner Stimmung nicht wieder zu erkennen. Die Leibschermerzen, welche sich unter der Fleischdiät einstellten, belästigten den Pat. nur in geringem Grade. Er empfand nur vorübergehend ein unbehagliches Gefühl. Die Kräfte hoben sich sichtlich, was ich nicht zum geringen Theile auf die Massage zurückführe, so dass Pat. am 13. Juni schon 25 Minuten im Zimmer auf und abzugehen im Stande war, während er bei Beginn der angestellten Beobachtungen (cf. 16. Mai) nur mit grösster Mühe zu der 10 Schritte weit entfernten Wage zu gehen vermochte.

Der Durst, das so früh auftretende und charakteristische Symptom der Zuckerharnruhr, war auch bei unserem Pat. in hohem Grade gesteigert. Unter der absoluten Fleischdiät sank der Flüssigkeitsbedarf beträchtlich. Seit dem 23. Mai, an welchem Tage die letzten Spuren von Zucker aus dem Harn verschwunden waren, schwankte die Flüssigkeitsaufnahme bis zum abermaligen Auftreten von Zucker im Harn in bedeutend geringeren Grenzen (998—1846 grm.) als während der Zuckerausscheidung vom 1. bis zum 14. Juni (1460—3970 grm.). Der Durst stieg und

fiel also mit der Zuckerbildung, wie aus folgender Tabelle ersichtlich.

Woche.	Patient nahm an Flüssigkeit auf:	Patient schied an Zucker aus:
I.		
18.—24. Mai	13540 Grm.	179,7 Grm.
II.		
25.—31. „	10082 „	— „
III.		
1.—7. Juni	15397 „	381,38 „
IV.		
8.—14. „	22262 „	509,79 „

Auffallend genug war es, dass, nachdem die Amylaceen dem Diabetiker entzogen wurden, tatsächlich das Durstgefühl nachliess. Mit dem Verschwinden des Zuckers aus dem Harn sank dann gleichfalls die Flüssigkeitsaufnahme, um mit dem zunehmenden Zuckergehalt des Harns wieder in der dritten und vierten Woche zu steigen.

Auf die Pflege der Haut wurde besonders Acht gegeben. Die starke Trockenheit und die Abschilferung derselben verlangten dazwischen Bäder, die Pat. am 23., 28. Mai und 5. Juni erhielt. (Die Blase musste Pat. natürlich vorher entleeren.)

Auffallend ist die Temperaturerhöhung, welche vom ersten Tage der absoluten Fleischdiät (18. Mai) auftrat. Pat. hatte in den drei ersten Tagen, (15. bis 18. Mai) ebenso wie vor den angestellten Be-

obachtungen täglich Eiswasser zugewiesen bekommen. Da er dasselbe zurückwies erhielt er vom 18. Mai an stets Trinkwasser von Zimmertemperatur, und nahm besonders während der letzten Periode grössere Quantitäten warmen Getränkes zu sich. Die Temperatursteigerung liess sich vielleicht, da jeder andere Anhaltspunkt dafür fehlte auf die grosse Temperaturschwankung der aufgenommenen Flüssigkeitsmassen zurückführen, zumal Foster¹⁾ in einem Versuche den Einfluss der warmen und kalten Getränke auf die Körpertemperatur eines Diabetikers nachgewiesen hat.

Von Seiten des Sehvermögens liessen sich auf beiden Augen Störungen durch Cataractbildung constatiren. Pat. konnte nicht einmal auf 2 Schritte die Umrisse eines Menschen erkennen. Mit dem Verschwinden des Zuckers aus dem Harn trat aber eine sichtliche Besserung ein. Am 1. Juni also am 15. Tage nach Einführung der absoluten Fleischdiät vermochte Pat. Bart, Nase, Mund, den aufsteigenden Rauch seiner Papyros, die Anzahl der vorgehaltenen Finger (cf. 1. VI) erkennen, freilich nur auf sehr geringe Entfernung. Mit dem Auftreten von Zucker im Harne begann die Sehkraft abzunehmen, so dass Pat. am 14. Juni wieder fast vollständig seines

1) Foster, clin. med. p. 264 (Ziemssen Bd. XIII p. 177).

Augenlichtes beraubt war. Wahrnehmbare Veränderungen in der Linsentrübung liessen sich nicht constatiren. Ueber zwei ähnliche Fälle berichtet Seegen¹⁾, bei welchen mit dem Schwinden der diabetischen Symptome eine Besserung, mit dem Wiederauftreten des Zuckers im Harn eine nachweisbare Verschlimmerung des Sehvermögens sich verzeichnen liess.

Was die Verdauung betrifft, so traten, wie oben erwähnt, bald Störungen derselben ein, indem sich Durchfälle, welche bei Diabetikern zur Ausnahme gehören²⁾, einstellten. Um so auffallender war es, dass sie gerade bei animalischer Kost auftraten, welche die sonst gewöhnlich vorherrschende Stuhlverstopfung der Diabetiker bei gleichbleibender guter Verdauung nach Angabe vieler Autoren in der Regel eher befördern als rückgängig machen soll. Dass die Assimilation der Nahrung auch sogar während der relativ grossen Nahrungsaufnahme in der letzten Periode keineswegs durch die Durchfälle wesentlich beeinträchtigt war, die animalische Kost gleichbleibend gut vertragen wurde, dafür sprechen die quantitativ bis zum letzten Versuchstage ziemlich gleichbleibenden täglichen Faecalmassen. Letztere zeigten bis zuletzt keineswegs einen Mangel an Gallenfarbstoff, nur

1) Seegen, der Diabetes mellitus, p. 112.

2) Frerichs: Ueber den Diabetes. p. 68.

3 Stuhlentleerungen waren von grau-brauner Farbe (31. Mai—2. Juni). Ein Schwinden des Gallenfarbstoffes bis zum thonartigen Aussehen der Faeces, wie es von manchen Autoren beobachtet worden ist, liess sich in unserem Falle nicht nachweisen.

Appetitlosigkeit, schlechte Verdauung, Symptome eines Magencatarrhs traten nicht auf. Es ist erstaunlich, welche Quantitäten an Nahrung Pat. besonders in der letzten Periode zu bewältigen vermochte, ohne dabei grössere Faecalmassen bei relativ geringer Harnausscheidung zu entleeren. Durch diese noch erhaltene Assimilationsfähigkeit des Pat. ist bei der grossen Nahrungsaufnahme das Steigen des Körpergewichts in der letzten Periode wol erklärlich. Die Notizen über das tägliche Körpergewicht (Tabelle D) ergaben, dass Pat. während der ersten Periode und auch vor derselben also bei gemischter Kost einen beträchtlich grösseren Gewichtsverlust aufwies, als bei der absoluten Fleischdiät, unter welcher Pat. bei sehr reichlicher Nahrungszufuhr an Gewicht zunahm. Die Zuckerausscheidung vermehrte sich während der grossen Nahrungszufuhr in der IV. Periode.

Frerichs¹⁾ berichtet über eine von ihm genau beobachtete Patientin, welche bei gemischter Kost täglich 437 Grm. bei rein animalischer nur 200 Grm. an Körpergewicht verlor.

1 Frerichs: Ueber den Diabetes, p. 74.

Bei vorliegender Beobachtung betrug die Körpergewichtsabnahme unter Zufuhr gemischter Kost durchschnittlich 360 grm. täglich, unter der absoluten Fleischdiät, während der 2. Periode 365 Grm., der 3. Periode (Fleischdiät mit geringer Zufuhr von Milch) 52,5 Grm. während in der vierten (absolute Fleischdiät) 228 Grm. tägliche Zunahme des Körpergewichts verzeichnet werden konnte.

Stellen wir die 2. und 4. Periode, beide unter absoluter Fleischdiät einander gegenüber, so finden wir, dass in der 4. Periode bei bedeutend grösserer Nahrungszufuhr (täglich durchschnittlich 2149 Grm. Nahrung in fester Form und 3197 Grm. Flüssigkeitsquantum) als in der 2. Periode (tägl. durchschnittl. 1159 Grm. in fester Form und 1859 in flüssiger Form) das Körpergewicht in der 4. Periode gestiegen, in der 2. gefallen war.

Aus der Betrachtung der Tabelle C ergibt sich, dass mit dem Verschwinden des Zuckers aus dem Harn auch die Harnmenge abnahm, andererseits wieder mit dem Auftreten von Zucker die Wasserausscheidung durch die Nieren eine beträchtliche Höhe erreichte. Ein Parallelismus zwischen Zucker und Wasserausscheidung, worauf Vogel schon aufmerksam gemacht hat, liess sich an unserem Kranken constatiren. Mit dem Auftreten von Zucker stieg die Harnmenge und ebenso die Aufnahme des tägl.

Flüssigkeitsquantums. Das grössere Durstgefühl, welches Pat. während der Zuckerausscheidung plagte, bedingte eine grössere Wasseraufnahme und daher auch eine grössere Harnausscheidung. — Freilich giebt es auch viele Fälle in der Literatur, welche durch die Vogelsche Theorie nicht ihre Erklärung finden. Welche Momente aber die Zuckerproduction und mit ihr parallel gehend die Harnausscheidung und grosse Wasseraufnahme bei unserem Fall bedingten, ist augenblicklich schwer zu entscheiden. Das Verhalten des Zuckerquantums zur Harnausscheidung, Wasserzufuhr und Nahrungsaufnahme ergibt sich aus folgender Tabelle.

Woche.	Pat. schied Zucker aus in Grm.	Pat. schied Harn aus in Grm.	Pat. nahm an Flüssigk. zu sich in Grm.	Pat. nahm Nahrung in fester Form zu sich in Grm.
I.				
18.—24. Mai	179,7	15472,5	13540	8146
II.				
25.—31. „	—	11351,7	10082	7686
III.				
1.—7. Juni	381,38	20595,4	15397	11247
IV.				
8.—14. „	509,79	33105,8	22262	15261

Bei unserem Pat. stieg mit der im Harn auftretenden Zuckermenge parallel Flüssigkeitsaufnahme und Wasserausscheidung durch die Nieren. Die Wasserabgabe aus dem Körper ist freilich in obiger Ta-

belle durchweg grösser als die Zufuhr, was aber möglich ist, da die Flüssigkeitsmengen der in fester Form aufgenommenen Nahrung nicht in obiger Tabelle verzeichnet sind. Dieselben betragen aber bekanntlich einen grossen Procentsatz der festen Nährstoffe.

Die weiter unten veröffentlichte 31 tägige Versuchsreihe über Perspiratio insensibilis bei demselben Pat. ergibt, dass die Gesamtausgaben nie grösser, als die Gesamteinnahmen waren, doch, wenn solches gelegentlich auftrat, sank das Körpergewicht dafür um die entsprechende Anzahl von Grammen.

Die Berichte über die Harnausscheidung während des Tages und der Nacht lauten verschieden. In vorliegendem Falle betrug die Gesamtsumme des am Tage gelassenen Harns der ganzen Versuchsreihe 35052 CC., des in der Nacht gelassenen 47210 CC., während aus den einzelnen Tagesbeobachtungen kein deutliches Bild sich entwerfen lässt. Nur an 8 Tagen wurde von 8 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends mehr Harn ausgeschieden als in der von 8 Uhr Abends bis 8 Uhr Morgens angenommenen Nachtzeit. Pat. musste stets um 8 Uhr Morgens und 8 Uhr Abends die Blase so viel als möglich entleeren. Külz kam freilich zum umgekehrten Resultat, ebenso auch andere Autoren. Frerichs giebt darüber nichts Genaues an.

Das specf. Gew. des Harns war durchweg hoch; es schwankte zwischen 1,025 und 1,042. Letzteres

entsprach dem zuckerreichsten Harn. Mit dem Zuckergehalt sank und stieg das spec. Gew. mit ziemlicher Regelmässigkeit.

Die Farbe des Harns war stets blass-gelb, schillerte in's Grünliche und war meist klar; nach einigen Stunden trübte sich die in 24 Stunden gesammelte Harnmenge. Die Reaction war stets sauer, die Eisenchloridreaction durchweg negativ.

Am 19. Mai trat zum ersten Mal Eiweiss auf, welches bis zum letzten Versuchstage nachweisbar war. Am 23. Mai betrug der Eiweissgehalt 0,41 %.

Die Untersuchung auf Eiweiss wurde täglich angestellt, ebenso die microscopische Untersuchung des Harns. Einmal wurde ein Cylinder gefunden, sonst traten nie irgendwelche morphotische Elemente, weder weisse, noch rothe Blutkörperchen im Harn auf, welche auf eine tiefergreifende Nierenaffection hätten schliessen lassen können, zumal jeglicher andere Anhaltspunkt dafür fehlte. Da das Eiweiss am 2. Tage der absoluten Fleischdiät im Harn nachweisbar war, Pat. aber Eier in grösserer Anzahl zu sich nahm, so ist es möglich, dass die Albuminurie bei unserem Diabetiker in Folge dieses Umstandes aufgetreten ist, wie Patrick T eg a r t¹⁾ zuerst darauf aufmerksam gemacht hat.

1) Ziemssen Lehrb. der spec. Path. u. Therap. Bd. XII, 2 p. 161.

Die Zuckerausscheidung, auf welche wir gelegentlich schon zu sprechen kamen (Tab. C.), verhielt sich je nach der Diät verschieden. In der ersten Periode (gemischte Kost) schied Pat. 129,85 bis 284,088 grm. Zucker tägl. aus. Mit dem 18. V., an welchem Tage Pat. auf absolute Fleischdiät gesetzt wurde, sank die ausgeschiedene Zuckermenge auf 68,77 grm., um am 5. Tage unter dieser rationellen Diät vollständig zu verschwinden.

Mit der Abnahme des Zuckergehaltes sank auch zugleich die Wasserausscheidung, die Flüssigkeitszufuhr und Nahrungsaufnahme, was schon (p. 67) erwähnt wurde.

K ü l z ¹⁾ hat in seinen vortrefflichen Arbeiten an zwei Zuckerkranken, welche auf entsprechende Diät gesetzt waren, um bei beiden eine annähernd gleiche Zuckerausscheidung zu erzielen, den Nachweis geliefert, dass bei derselben Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr die Harnausscheidung schwankte, bei der einen Pat. zwischen 2400 und 2800 Cc., bei der anderen zwischen 1072 und 1096 Cc. Wobei der Pat. S. die in gleicher Quantität aufgenommene Wassermenge geblieben ist, ob eine ent-

1) E. Külz, Beiträge zur Pathologie und Therapie des Diabetes mellitus und Insipidus, Bd. 2, p 147.

sprechende Zunahme des Gewichts, Durchfälle oder eine grössere Perspiratio insensibilis als bei der Pat. D. verzeichnet werden konnte, darüber giebt Külz nichts an.

Külz's Beobachtung beweist uns, dass zwei Patienten, welche die gleiche Wassermenge zu sich nehmen mussten, durch die Nieren verschiedene Quantitäten abgaben, ohne dass die Befriedigung des Durstes, das characteristische Symptom des Diabetes, dabei in Betracht gezogen wurde. Patientin S. hatte ein geringeres Wasserbedürfniss.

Die Individualität des einzelnen Zuckerkranken kommt meiner Ansicht nach aber sehr in Betracht.

Ich legte mir die Frage vor, ob bei dem einzelnen Diabetiker bei vermehrter Zuckerbildung resp. Zuckerabnahme im Harn auch das Bedürfniss nach Wasseraufnahme und dem entsprechend die Wasserausfuhr durch die Nieren steige resp. falle. Dem Pat. stand es, wie oben erwähnt, frei soviel zu essen und zu trinken, als er zur Stillung seines Durstes und Heisshungers bedurfte, zumal Pat. sich nur unter diesen Bedingungen den Untersuchungen unterzog, dazu das Körpergewicht so stark gesunken war, dass eine Erhöhung desselben durchaus geboten schien. Durch eine reichliche Zufuhr animalischer Kost wurde letzteres auch erreicht. Mit dem Schwinden des Zuckers aus dem Harn sank bei unserem Pat. das Wasser-

bedürfniss dem entsprechend Wasseraufnahme und Wasserausscheidung durch die Nieren. Sobald aber der Zustand des Pat. sich verschlechterte (cf. 18. Versuchstag), die leichte in die schwere Form unter der Beobachtung überging und Zucker wieder im Harn auftrat, stieg auch das Durstgefühl, die Flüssigkeitsaufnahme und die Harnabsonderung.

Ich referire nur die Thatsachen ohne theoretisiren zu wollen. Einmal sank mit dem Zuckergehalt des Harn's die Harnmenge und die Wasseraufnahme, zum andern Male stiegen letztere entsprechend der grösseren wiederauftretenden Zuckermenge. Ein Parallelismus war jedenfalls zu constatiren. Ob aber die Zuckerausscheidung die grössere Wasseraufnahme und Harnabsonderung veranlasste, oder diese Symptome zusammen durch die starke psychische Alteration, die verzweifelte Stimmung, die Verschlimmerung im Zustande des Pat. bedingt waren, wage ich nicht zu entscheiden.

Wenn es Külz¹⁾ aber auf Grundlage von Thierversuchen erscheint, dass es in erster Instanz von der besonderen Störung im Nervensystem abhängig ist, ob in einem bestimmten Falle von Diabetes vermehrte Zuckerausscheidung mit oder ohne Polyurie einhergeht, so kann ich seiner These auf

1) Külz, Beiträge z. Path. und Ther. Bd. 2. p. 149.

Grundlage der hier niedergelegten Beobachtungen nur voll und ganz beistimmen.

Dass eine Verschlimmerung des Zustandes allein durch die starke psychische Erregung, da sonst kein Grund ausfindig zu machen war, eintrat, dafür sprechen die Zahlen in der Tab. C und die vielfachen Angaben in der Literatur von Senator¹⁾, Seegen²⁾ Külz etc.

Pat. vertrug während der II. Periode die Zufuhr von 400 grm. Milch ohne irgendwelche Verschlimmerung seines Zustandes, Külz³⁾ berichtet, dass auch bei der schweren Form des Diabetes eine nicht unerhebliche Menge von Milch assimiliert werden kann. Wenngleich auch gerade nicht grössere Mengen Milchzucker (zu 5 % in der Milch angenommen – 20 grm.) tägl. eingeführt wurden, so spricht der Mangel der Zuckerausscheidung für die bei Diabetikern der leichten Form noch vorhandene Assimilationsfähigkeit. Es wäre nach den exacten Experimenten Cantani's⁴⁾ sicher besser gewesen, wenn während der letzten Periode, in welcher der Heiss-hunger und das Durstgefühl so stark ausgeprägt

1) Senator, Ziemssen, Handb. der spec. Pathologie u. Ther. Bd. 13. p. 126.

2) Seegen, der Diabetes mellitus, p. 75.

3) E. Külz, Beiträge zur Path. und Ther. des Diabetes mellitus Bd. 1. p. 167.

4) Cantani, d. Diabetes mellitus, p. 200.

waren, die durch Befriedigung derselben bedingte grössere Zuckermenge durch Entziehung von Nahrung einzuschränken. Seegen¹⁾ giebt dagegen an, dass die animalische Kost in jeder Menge erlaubt sei.

Während der 3. Periode wurden Pat. auch zur Zeit der beginnenden Zuckerausscheidung dieselben Quantitäten Milch in den ersten Tagen bewilligt. Trotzdem dieselbe aber in den letzten Tagen der 3. Periode in geringerer Menge zugeführt wurde, stieg die Zuckermenge dennoch und am 1. Tage der 4. Periode, wo die absolute Fleischdiät wieder aufgenommen wurde, fast um das Doppelte, während gerade an diesem Tage die in fester Form aufgenommene Nahrung im Vergleich zum vorhergehenden 97 Grm. weniger betrug.

Der Einwand einer Täuschung kann bei den oben angegebenen Vorsichtsmassregeln zurückgewiesen werden, zumal während der letzten Periode Pat. keinen Augenblick Tag und Nacht ohne Aufsicht gelassen wurde.

Da unter der absoluten Fleischdiät in der 2. Periode der Zuckergehalt sofort sank und in einigen Tagen gänzlich verschwand, so handelte es sich um die leichte Form des Diabetes, trotzdem die hochgradige Abmagerung, die graue trockene Haut, die

1) Seegen, d. Diabetes mellitus, p. 174.

stark gesunkene Muskelkraft eher für die 2. Form gesprochen hätten.

Da nun unter der geringen Zufuhr von Milch (— 20 Grm. Milchzucker), welche Pat. sehr gut zu assimiliren im Stande war, im Harn vom 1.—2. Juni Zucker erschien und der Zuckergehalt bei abnehmender Darreichung von Milch stetig stieg, unter der am 7. Juni eingeleiteten absoluten Fleischdiät fast um das Doppelte zunahm, trotz strengster animalischer Diät nicht mehr während der letzten achttägigen Beobachtung schwand, musste der Diabetes der schweren Form zugezählt werden. Von anderen Autoren wurde in ähnlichen Fällen stets ein sofortiges Sinken der Zuckerausscheidung bemerkt, welches auch bei unserem Pat. am 18. Mai constatirt werden konnte.

Ich habe, sagt Seegen¹⁾, nur in wenigen Fällen gesehen, dass die 1. Form, welche Traube²⁾ als erstes Stadium auffasst in die 2. Form übergeht. Sehr häufig und fast immer, wenn entsprechende Diät beobachtet wird, bleibt die erste Form stationär, d. h. bei Fleischnahrung erscheint nie Zucker. Umgekehrt tritt die 2. Form also das 2. Stadium Traube's in den schweren Fällen von Diabetes so-

1) Seegen, d. Diabetes mellitus p. 68.

2) M. Traube, Ueber die Gesetze der Zuckerausscheidungen. Virchow's Archiv. Bd. 4.

gleich auf, ohne dass die leichtere Form vorausgegangen wäre.«

Die vorliegende Beobachtung beweist nun zur Evidenz, dass die eine Form in die andere überzugehen vermag. Es handelt sich daher wohl bei den verschiedenen Formen nicht um verschiedene Krankheiten, sondern um 2 verschiedene Grade, die auch Cantani¹⁾ annimmt, wenn er sagt: »dass es sich nur um zwei verschiedene Grade ein- und derselben Krankheit handelt, haben wir mehrfach bei dem Diabetes des ersten Grades beobachtet, welchen man den Diabetes der Amylivoren nennen kann und der, sobald er nicht geheilt wird, nach und nach zum zweiten Grade der Carnivoren übergeht.«

Wenn die Melliturie in der zweiten Form des Diabetes stets durch die animalische Kost eingeschränkt wird, so liess sich dieses bei vorliegender Beobachtung, bei der unter der schärfsten Controlle die leichte Form in die schwere überging, nicht constatiren. Die Zuckermenge stieg im Gegentheil vom 6. auf 7. VI von 79,38 auf 111,72 grm. gerade an jenem Tage, an welchem Pat. im Vergleich zum vorhergehenden Tage weniger animalische Kost, am 6. VI aber noch 200 Grm. Milch zu sich genommen hatte. Grosse Sprünge in der Zuckerausscheidung

1) Cantani, Diabetes mellitus, p. 159

will Cantani¹⁾ nie gesehen haben und behauptet mit Sicherheit, dass der Kranke dann lüge, wenn er versichert, nur Fleisch und nur dasselbe Quantum, wie die früheren Tage gegessen zu haben. Der 1. Tag der 4. Periode, in welcher Pat. keinen Augenblick ohne Aufsicht blieb, spricht sichtlich dagegen. Es können also auch Ausnahmen eintreten. Am 7. VI nahm Pat. weniger an fester Nahrung, keine Milch mehr zu sich schied aber doch trotzdem 32 gm. mehr Zucker aus, als am vorhergehenden Tage, freilich nur 12 gm. mehr als die von Cantani für möglich gehaltenen Schwankungen.

Pro Woche stieg mit der Quantität der animalischen Kost auch die Melliturie.

Der Uebergang der einen Form in die andere ist in der Literatur schon mehrfach erwähnt, wie von Senator, Frerichs, Külz, Seegen, Foster, Griesinger, u. a. grösstentheils wurde er aber nicht unter exacter fortlaufender Beobachtung festgestellt.

Manches liesse sich noch einer näheren Besprechung unterziehen doch bin ich absichtlich Schlussfolgerungen aus dem Wege gegangen für die sich freilich manche Anhaltspunkte boten. Meine Hauptaufgabe die ich mir gestellt, war aber die auf jede Weise zu erreichende vollständige Isolirung des Pat., welche mir

1) Cantani, Diabetes mellitus, p. 116

freilich mit grossem Zeitverlust und dadurch bedingter Fortlassung mancher noch interessanten und werthvollen Untersuchung gelang. Ich kann daher aber diese Besprechung mit dem Bewusstsein schliessen, für die Sicherheit der Zahlen grösstmögliche Garantie, dem einzelnen aber, welcher sich für diese Frage interessirt, dadurch Gelegenheit für weitere theoretische Speculationen geboten zu haben, welche mir auf Grundlage einer Beobachtung nicht zustanden.

VII.

Ueber den Einfluss der Massage bei Diabetes mellitus.

Die Massage, welche heutzutage in den chirurgischen Behandlungsmethoden immer mehr Eingang findet, hat in der inneren Medicin verhältnissmässig leider noch wenig Beachtung gefunden. Der wohlthätige Einfluss derselben ist jedem bekannt, der sich einmal ihr unterzogen hat, wieviel mehr ist sie den Kranken zu gönnen, denen die nothwendige und erfrischende Körperbewegung untersagt, eine Motion durch stark reducirte Körperkraft unmöglich geworden ist. Abgesehen von diesen Körper und Geist erfrischenden Momenten, das Allgemeinbefinden so beträchtlich hebenden Einfluss der Massage, kann ausserdem noch manchen anderen Indicationen gerade durch die Massage Genüge geleistet werden. Diesen Erörterungen und den über die Wirkung der Massage bekannten Erfahrungen zu Folge, schien mir die Anwendung derselben gerade bei unserem Pat., der durch die Zuckerkrankheit sich in so jämmerlichem Zustande befand, dass er schon vor der von mir aufgenommenen Beobachtung aufgegeben war,

um so mehr indicirt, weil vor Allem der Kräftezustand des Pat. so stark gesunken war, die trockene Haut, das Kältegefühl, die psychische Depression gehoben werden sollten, um dadurch das Allgemeinbefinden des Pat., wenn auch nur um ein geringes zu heben. Ich wagte dieses umsomehr, als die körperliche passive Bewegung der Verminderung der Zuckerausscheidung nur zu Gute kommen konnte. Nach den Arbeiten von Külz über den nachgewiesenen wohlthätigen Einfluss der Bewegung auf die Zuckerausscheidung war ich mir wol bewusst durch diese verhältnissmässig geringe passive Motion nur wenig resp. gar keinen Einfluss auf die Zuckerausscheidung zu erreichen. Es wäre jedenfalls lohnend bei Diabetikern mit kräftiger Massage Versuche über die Einwirkung derselben auf die Zuckerabsonderung anzustellen. Mancher practische Vortheil liesse sich dadurch erzielen.

In vorliegender Arbeit war dieses jedenfalls nicht der Zweck, da es durch die Verhältnisse unmöglich gemacht wurde, zu brauchbaren Resultaten über die Massagewirkung auf die Zuckerausscheidung zu gelangen. Die Nahrungszufuhr hätte dann vor allen Dingen eine durchweg gleiche sein müssen. Es kam mir wesentlich darauf an bei unserem Zuckerkranken zu constatiren, welchen Einfluss die Massage bei absoluter Fleischdiät hat:

- 1) Auf das Kältegefühl,
- 2) Die Hauttemperatur,
- 3) Die Trockenheit der Haut,
- 4) Die Muskelkraft,
- 5) Das Allgemeinbefinden.

Das durch die starke Abmagerung erklärliche Frösteln, über welches Pat. trotz der warmen Zimmertemperatur (15—20° R.) unter doppelten Decken empfand, trat nach der Massage seit dem 25. Juni nicht mehr auf. Pat. wusste die „schöne Salbe“ nicht genug zu loben und bat fast täglich um dieselbe, da er sich nach derselben so wohl fühle und neben dem behaglichen Wärmegefühl eine Zunahme der Gelenkigkeit beobachte. Das nach der Massage auftretende Wärmegefühl verglich Pat. mit dem in einem russischen Dampfbade. Die Haut fühlte sich nach der Massage stets warm an, Anfangs kürzere, später längere Zeit (cf. Tab. D).

Die Erhöhung der Körpertemperatur kann mit der Massage keineswegs in Zusammenhang gebracht werden, da Solches bei der quantitativ verschiedenen Nahrungszufuhr durchaus unstatthaft wäre, andererseits eine forcirte Massage, wie sie am 12. Juli vorgenommen wurde, keine grossen Schwankungen hervorzubringen vermochte.

Dass die Haut bei Diabetikern häufig einer besonderen Behandlung unterzogen werden muss, ist

erklärlich, wenn man es mit Hautausschlägen, Furunkeln etc. zu thun hat. Aber auch schon die oft nur trockene Haut der Zuckerkranken, ist einer Pflege bedürftig. Durch die angewandte Massage wurde die schmutzig-graue Hautfarbe etwas weisser, die Sprödigkeit und Trockenheit schwand und die stellenweise aufgetretene Abschilferung blieb aus.

Die Wirkung auf das Allgemeinbefinden war überraschend. Während Pat. am 15. Juni nur mit Mühe zur Wage gehen konnte und letztere desshalb an sein Bett gerückt werden musste, verfügte Pat. am letzten Versuchstage über eine genügend grosse Muskelkraft um 25 Minuten im Zimmer auf und ab zu gehen, trotzdem sich sein Zustand in Bezug auf diabetische Symptome bedeutend verschlimmert hatte.

Ein günstiger Einfluss der Massage lässt sich also nicht von der Hand weisen. Das allgemeine Wohlbefinden, die Zunahme der Muskelkraft, das Zurücktreten der psychischen Depression, das Schwinden des Kältegefühls, die Geschmeidigkeit der Haut wurden durch die Massage erreicht, was ich während der anzustellenden Untersuchungen nicht zu unterschätzen vermochte, da Pat. einerseits ohne Unlust sich den diätetischen Einschränkungen hingab und nicht einmal mit Ausnahme zweier Tage nach amylaceenreicher Nahrung ein besonderes Verlangen zeigte, sondern willig war dieselbe auch trotz der so strengen Controlle noch längere Zeit fortzusetzen.

VIII.

Einunddreissigtägige geschlossene Versuchsreihe über das Verhalten der Perspiratio insensibilis bei Diabetes mellitus.

Aus den Untersuchungen von Gaehtgens¹⁾ geht hervor, dass die Wasserausgabe aus dem Organismus eines Diabetikers längere Zeit hindurch grösser, als die Wasserzufuhr sein kann, ohne dabei an Körpergewicht entsprechend zu verlieren.

Es ist mit Recht wiederholt in fast jeder Monographie erwähnt, dass bei einem solchen allen physiologischen Gesetzen widersprechenden Resultate es sich trotz der so sorgfältigen Untersuchungen um Täuschung von Seiten des Pat. gehandelt haben muss. Die Frage ob mehr Flüssigkeit ausgeschieden werden kann, als in den Körper aufgenommen worden ist, hat schon in ältester Zeit eine Lösung gesucht und wenn bis auf die neueste Zeit trotz der vielen erschienenen Arbeiten diese Frage noch immer eine offene genannt werden muss, so sucht Engelmann²⁾ mit Recht den Grund in Folgendem:

1) Gaehtgens, Diss. Dorpat 1866.

2) Engelmann, in der Arbeit von Külz: Beitrag zur Path. und Therap. des Diabetes mellitus, Bd. 2. p. 33.

1) Die verschiedenen Autoren haben mit grösserer oder geringerer Genauigkeit resp. Objectivität gearbeitet.

2) Manche Autoren haben nur das in Form von Flüssigkeit, nicht aber das in Form von fester Nahrung eingenommene Wasser in Rechnung gebracht.

3) Die diabetischen Pat. haben meist eine grosse Neigung den Beobachter zu täuschen.

4) Man hat die Resultate, die man an einzelnen Fällen erhalten hat auf alle Fälle ausgedehnt, mit andern Worten, man hat der Eigenthümlichkeit der unter sich so überaus verschiedenen Fälle von Zuckerruhr zu wenig Rechnung getragen.

5) Die Resultate hängen wesentlich von der Genauigkeit der zu den Versuchen benutzten Wage ab. Die Krankenwagen, deren wir uns gegenwärtig bedienen sind besser construirt, die Wägungen daher zuverlässiger.

Die Methode, welche ich zur Bestimmung der Perspiratio insensibilis anwandte war die auch von Engelmann und Külz benutzte. Das Körpergewicht des Pat. wurde zu Anfang und zu Ende des Versuchstages gewogen (8 Uhr Morgens), zum Anfangsgewicht die Einnahmen zum Endgewicht die Ausgaben addirt und dann die beiden dadurch erhaltenen Zahlen von einander subtrahirt. Die Eintheilung der Tabellen behielt ich der besseren Uebersicht

wegen gleichfalls bei. Jeder Versuchstag dauerte von 8 Uhr Morgens des einen bis 8 Uhr Morgens des andern Tages. Gegen die von Engelmann in obigen Punkten enthaltenen Einwände habe ich mich zu wahren gesucht. Die Wagen, welche in Anwendung gezogen wurden, waren Eigenthum der Klinik und durchaus zuverlässig. Von einer Täuschung Seitens des Pat. konnte bei den oben geschilderten Vorsichtsmassregeln nicht die Rede sein, geschweige denn in der letzten Periode, in der Pat. keinen Augenblick bei Tag und Nacht unbewacht blieb und somit sowol die Nahrungszufuhr als auch jede Stuhl- und Harnentleerung genau controlirt wurde

Einen verallgemeinernden Schluss ziehe ich aus dem niedergelegten Beobachtungsmaterial in keiner Weise, da dazu nicht einmal die schon veröffentlichten grösstentheils mit der erforderlichen Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit angestellten Beobachtungen genügen dürften.

Die Resultate der einzelnen Versuchstage sind in folgenden Tabellen enthalten:

Tabelle I.

24-stündiger Versuch (15.—16. Mai).

Gewicht am 15. Mai 1885 8 Uhr früh = 45600 Grm.

E i n n a h m e n.		A u s g a b e n.	
Zeit.	Gramm.	Zeit.	Gramm.
8 Uhr Morgens	Milch 275	8 Uhr Morgens	173
" "	Brod 230	8 " Nachmittags	283
1 " Mittags	Fleisch 105	" "	3326,064
" "	Grütze 602		
" "	Brod 200		
6 " Abends	Milch 300		
" "	Brod 350		
24-stünd.	Wasser 1867		
Summe = 3929 Grm.		Summe = 3782 Grm.	

Gewicht am 16. Mai 8 Uhr früh = 45460 Grm.
 Anfangsgewicht + Einnahmen = 49529 "
 Endgewicht + Ausgaben = 49242 "
 24-stünd. Perspiration = 287 Grm.

Uebersicht der erhaltenen Resultate:

Datum des Versuchs.	Körpergewicht.	Einnahmen.	Ausgaben.	24-stünd Perspiration.
15. Mai 1885 8 Uhr früh bis 16. Mai 1885 8 Uhr früh.	A = 45600 Grm. E = 45460 Grm.	3929 Grm.	3782 Grm.	287 Grm.

Procentwerthe der Perspiratio insensibilis gegenüber:

Datum des Versuchs.	I. dem Körper- gewicht.	II. den Einnahmen.	III. den Ausgaben.
15. — 16. Mai.	0,63	7,302	7,588

Tabelle II.

24-stündiger Versuch (16—17 Mai).

Gewicht am 16. Mai 1885 8 Uhr früh = 45460 Grm

E i n n a h m e n.		A u s g a b e n.	
Zeit.	Gramm.	Zeit.	Gramm.
8 Uhr Morgens	290	8 Uhr Morgens	166
1 " Mittags	175	3 " Nachmittags	388
" "	159		
" "	739	Harn	2186,1
6 Uhr Abends	150		
" "	75		
	603		
	110		
" "	74		
24-stünd.	595		
Summe = 2970 Grm.		Summe = 2740,1 Grm.	

Gewicht am 17. Mai 8 Uhr früh = 44760 Grm.
 Anfangsgewicht + Einnahmen = 48430 " "
 Endgewicht + Ausgaben = 47500,1 " "
 24stünd. Perspiration = 929,9 Grm.

Uebersicht der erhaltenen Resultate:

Datum des Versuchs.	Körpergewicht.	Einnahmen.	Ausgaben.	24stünd. Perspiration.
16. Mai 1885 8 Uhr früh bis 17. Mai 1885 8 Uhr früh.	A = 45460 Grm. E = 44760 "	2970 Grm.	2740,1 Grm.	929,9 Grm.

Procentwerthe der Perspiratio insensibilis gegenüber:

Datum des Versuchs.	I. dem Körper- gewicht.	II. den Einnahmen.	III. den Ausgaben.
16.—17. Mai.	2,061	31,309	33,936

Tabelle III.

24-stündiger Versuch (17.—18. Mai).

Gewicht am 17. Mai 1885 8 Uhr Morgens = 44760 Grm.

E i n n a h m e n.		A u s g a b e n.	
Zeit.	Gramm.	Zeit.	Gramm.
8 Uhr Morgens	Milch 576		
" "	Brod 75	11 Uhr Morgens	Stuhlgang 433
" "	Butter 12		
" "	Eier 74		
1 " Mittags	Fleisch 195		
" "	Bohnensuppe 494		
" "	Brod 65		
6 " Abends	Milch 607		
" "	Brod 50		
" "	Eier 70		
24-stündl.	Wasser 1533	Harn	2737,5
Summe = 3751 Grm.		Summe = 3170,5 Grm.	

Gewicht am 18. Mai 8 Uhr früh = 44520 Grm.
 Anfangsgewicht + Einnahmen = 48511
 Endgewicht + Ausgaben = 47690,5
 24-stünd. Perspiration = 820,5 Grm.

Uebersicht der erhaltenen Resultate:

Datum des Versuchs.	Körpergewicht.	Einnahmen.	Ausgaben.	24-stünd. Perspiration.
17. Mai 1885 8 Uhr früh bis 18. Mai 1885 8 Uhr früh.	A = 44760 Grm. E = 44520 "	3751 Grm.	3170,5 Grm.	820,5 Grm.

Procentwerthe der Perspiratio insensibilis gegenüber:

Datum des Versuchs.	I. dem Körper- gewicht.	II. den Einnahmen.	III. den Ausgaben.
17.—18. Mai.	1,838	21,874	25,879

Tabelle IV.

24-stündiger Versuch (18.—19. Mai).

Gewicht am 18. Mai 1885 8 Uhr früh = 44520 Grm.

Einnahmen.		Ausgaben.	
Zeit.	Gramm.	Zeit.	Gramm.
8 Uhr Morgens	Eier 120	8 Uhr Morgens	303
"	Speck 75	Stuhlgang	290
"	Fleisch 138	"	2727
1 " Mittags	Fleisch 203		
"	Speck 81		
"	Eier 75		
"	Fisch 90		
6 " Abends	Eier 120		
"	Speck 59		
"	Fleisch 210		
"	Fisch 205		
"	Wasser 1825		
24-stünd.			
Summe = 3201 Grm.		Summe = 3230 Grm.	

Gewicht am 19 Mai 8 Uhr früh = 43500 Grm.
 Anfangsgewicht + Einnahmen = 47721 „
 Endgewicht + Ausgaben = 46730 „
 24-stund. Perspiration = 991 Grm.

Uebersicht der erhaltenen Resultate:

Datum des Versuchs.	Körpergewicht.	Einnahmen.	Ausgaben.	24-stünd Perspiration.
18. Mai 1885	A = 44520 Grm.	3201 Grm.	3230 Grm.	991 Grm.
8 Uhr früh bis	E = 43500 „			
19. Mai 1885				
8 Uhr früh.				

Procentwerthe der Perspiratio insensibilis gegenüber:

Datum des Versuchs.	I dem Körper- gewicht.	II. den Einnahmen.	III. den Ausgaben.
18.—19. Mai.	2,251	30,959	30,681

Tabelle V.

24-stündiger Versuch (19. — 20. Mai).

Gewicht am 19. Mai 1885 8 Uhr früh = 43500 Grm.

E i n n a h m e n.		A u s g a b e n.	
Zeit.	Gramm.	Zeit.	Gramm.
8 Uhr Morgens	120	8 1/2 Uhr Morgens	488
" "	50	1 " Nachmittags	205
" "	74	3 " Nachts	383
1 " Mittags	143		2315,3
" "	61	Harn	
" "	75		
6 " Abends.	120		
" "	210		
" "	170		
24-stünd.	1440		
Summe = 2463 Grm.		Summe = 3391,3 Grm.	

Gewicht am 20. Mai 8 Uhr früh = 41770 Grm.
 Anfangsgewicht + Einnahmen = 45963 "
 Endgewicht + Ausgaben = 45161,3 "
 24-stünd. Perspiration = 801,7 Grm.

Uebersicht der erhaltenen Resultate:

Datum des Versuchs.	Körpergewicht.	Einnahmen.	Ausgaben.	24-stünd. Perspiration.
19. Mai 1885 8 Uhr früh bis 20. Mai 1885 8 Uhr früh.	A = 43500 Grm. E = 41770 "	2463 Grm.	3391,3 Grm.	801,7 Grm.

Procentwerthe der Perspiratio insensibilis gegenüber:

Datum des Versuchs.	I. dem Körper- gewicht.	II. den Einnahmen.	III. den Ausgaben.
19.—20. Mai.	1,88	32,549	23,639

Tabelle VI.

24-stündiger Versuch (20.—21. Mai).

Gewicht am 20. Mai 1885 8 Uhr früh = 41770 Grm.

E i n n a h m e n.		A u s g a b e n.	
Zeit.	Gramm.	Zeit.	Gramm.
8 Uhr Morgens	Fisch 215	8 Uhr Abends	168
"	Eier 120	4 " Nachts	267
"	Speck 27	"	3282,5
"	Fleisch 112		
1 " Mittags	Fleisch 108		
"	Eier 74		
"	Fisch 295		
6 " Abends	Eier 115		
"	Fleisch 120		
"	Fisch 205		
24-stünd.	Wasser 2418		
Summe = 3809 Grm.		Summe = 3717,5 Grm.	

Gewicht am 21. Mai 8 Uhr früh = 41650 Grm.
 Anfangsgewicht + Einnahmen = 45579 „
 Endgewicht + Ausgaben = 45367,5 „
 24-stünd. Perspiration = 211,5 Grm.

Uebersicht der erhaltenen Resultate:

Datum des Versuchs.	Körpergewicht.	Einnahmen.	Ausgaben.	24-stünd. Perspiration.
20. Mai 1885 8 Uhr früh bis 21. Mai 1885 8 Uhr früh.	A = 41770 Grm. E = 41650 Grm.	3809 Grm.	3717,5 Grm.	211,5 Grm.

Procentwerthe der Perspiratio insensibilis gegenüber:

Datum des Versuchs.	I. dem Körper- gewicht.	II. den Einnahmen.	III. den Ausgaben.
20.—21. Mai.	0,507	5,552	5,689

Tabelle VII.

24-stündiger Versuch (21.—22. Mai).

Gewicht am 21. Mai 1885, 8 Uhr früh = 41650 Grm.

E i n n a h m e n.		A u s g a b e n.	
Zeit.	Gramm.	Zeit.	Gramm.
8 Uhr Morgens	Fisch 215	9 ³ / ₄ Uhr Morgens	Stuhlgang 160
" "	Eier 110	7 " Abends	" 135
" "	Speck 22	4 " Nachts	" 200
1 " Mittags	Eier 60		Harn 2205,9
" "	Fisch 190		
" "	Bouillon 619		
6 " Abends	Eier 117		
" "	Fleisch 55		
" "	Fisch 307		
" 24-stünd.	Wasser 1830		
Summe = 3525 Grm.		Summe = 2700,9 Grm.	

Gewicht am 22. Mai 8 Uhr früh = 41650 Grm.
 Anfangsgewicht + Einnahmen = 45175 "
 Endgewicht + Ausgaben = 44350,9 "
 24-stünd. Perspiration = 824,1 Grm.

Uebersicht der erhaltenen Resultate:

Datum des Versuchs.	Körpergewicht.	Einnahmen.	Ausgaben.	24-stünd. Perspiration.
21. Mai 1885 8 Uhr früh bis 22. Mai 1885 8 Uhr früh.	A = 41650 Grm. E = 41650 Grm.	3525 Grm.	2700,9 Grm.	824,1 Grm.

Procentwerthe der Perspiration insensibilis gegenüber:

Datum des Versuchs.	I. dem Körper- gewicht.	II. den Einnahmen.	III. den Ausgaben.
21.—22. Mai.	1,978	30,512	23,378

Tabelle VIII.

24-stündiger Versuch (22.—23. Mai).

Gewicht am 22. Mai 1885 8 Uhr früh = 41650 Grm.

E i n n a h m e n.		A u s g a b e n.	
Zeit.	Gramm.	Zeit.	Gramm.
8 Uhr Morgens	Fisch 52	11 Uhr Morgens	Stuhlgang 135
1 " " Mittags	Eier 119	3 " Nachmittags	" 115
" " "	Fleisch 115	11 1/2 " Abends	Harn 190
" " "	Eier 75	5 " Morgens	191
" " "	Fisch 285		1985,3
" " Abends	Bouillon 674		
" " "	Eier 110		
" " "	Fleisch 25		
" " "	Fisch 197		
24-stünd.	Wasser 1890		
Summe = 3542 Grm.		Summe = 2616,3 Grm.	

Gewicht am 23. Mai 8 Uhr früh = 42000 Grm.
 Anfangsgewicht + Einnahmen = 45192 "
 Endgewicht + Ausgaben = 44616,3 "
 24-stünd. Perspiration = 575,7 Grm.

Uebersicht der erhaltenen Resultate:

Datum des Versuchs.	Körpergewicht.	Einnahmen.	Ausgaben.	24 stündige Perspiration.
22. Mai 1885	A = 41650 Grm.	3542 Grm.	2616,3 Grm.	575,7 Grm.
8 Uhr früh bis 23. Mai 1885	E = 42000 "			
8 Uhr früh.				

Procentwerthe der Perspiratio insensibilis gegenüber:

Datum des Versuchs.	I. dem Körper- gewicht.	II. den Einnahmen.	III. den Ausgaben.
22. -- 23. Mai.	1,376	16,253	22,004

Tabelle IX.

24-stündiger Versuch (23.—24. Mai).

Gewicht am 23. Mai 1885 8 Uhr früh = 42000 Grmm.

E i n n a h m e n.		A u s g a b e n.	
Zeit.	Gramm.	Zeit.	Gramm.
8 Uhr Morgens	110	12 Uhr Mittags	75
" "	25	6 " Abends	105
1 " Mittags	320	8 " "	200
" "	75	6 " Morgens	162
" "	202	" "	1391,6
" "	439	Harn	
1 " Abends	75		
" "	275		
" "	90		
24-stünd.	559		
Summe = 2170 Grm.		Summe = 1933,6 Grm.	

Gewicht am 24. Mai 8 Uhr früh = 41550 Grm.
 Anfangsgewicht + Einnahmen = 44170 "
 Endgewicht + Ausgaben = 43483,6 "
 24-stünd. Perspiration = 686,4 Grm.

Uebersicht der erhaltenen Resultate:

Datum des Versuchs.	Körpergewicht.	Einnahmen.	Ausgaben.	24-stünd. Perspiration.
23. Mai 1885 8 Uhr früh bis	A = 42000 Grm.	2170 Grm.	1933,6 Grm.	686,4 Grm.
24. Mai 1885 8 Uhr früh.	E = 41550 "			

Procentwerthe der Perspiration insensibilis gegenüber:

Datum des Versuchs.	I. dem Körper- gewicht.	II. den Einnahmen.	III. Ausgaben.
23.—24. Mai.	1,643	31,631	35,498

Tabelle X.

24-stündiger Versuch (24.—25. Mai).

Gewicht am 24. Mai 1885 8 Uhr früh = 41550 Grm.

E i n n a h m e n.		A u s g a b e n.	
Zeit.	Gramm.	Zeit.	Gramm.
8 Uhr Morgens	Eier 120	12 Uhr Mittags	115
1 „	Fleisch 205	6 „ Abends	163
1 „	Fleisch 108	4 „ Morgens	175
1 „	Eier 80	Harn	1574,9
1 „	Fisch 180		
1 „	Bouillon 518		
6 „ Abends	Eier 75		
6 „	Fleisch 362		
24-stünd.	Wasser 1328		
Summe = 2976 Grm.		Summe = 2027,9 Grm.	

Gewicht am 25. Mai 8 Uhr früh = 41700 Grm.
 Anfangsgewicht + Einnahmen = 44526 "
 Endgewicht + Ausgaben = 43727,9 "
 24-stünd. Perspiration = 798,1 Grm.

Uebersicht der erhaltenen Resultate:

Datum des Versuchs.	Körpergewicht.	Einnahmen.	Ausgaben.	24-stünd. Perspiration.
24. Mai 1885 8 Uhr früh bis 25. Mai 1885 8 Uhr früh.	A = 41550 Grm. E = 41700 "	2976 Grm.	2027,9 Grm.	798,1 Grm.

Procentwerthe der Perspiratio insensibilis gegenüber:

Datum des Versuchs.	I. dem Körper- gewicht.	II. den Einnahmen.	III. den Ausgaben.
24.—25. Mai	1,917	26,817	39,355

Tabelle XI.

24-stündiger Versuch (25.—26. Mai).

Gewicht am 25. Mai 1885 8 Uhr früh = 41700 Grm.

E i n n a h m e n.		A u s g a b e n.	
Zeit.	Gramm.	Zeit.	Gramm.
8 Uhr Morgens	120	Stuhlgang	110
1 " " Mittags	205	" "	230
" " "	108	Harn	1523,6
" " "	80		
" " "	180		
6 Uhr Abends	518		
" " "	75		
" " "	362		
24-stünd.	816		
Summe = 2464		Summe = 1863,6 Grm.	

Gewicht am 26. Mai 8 Uhr früh = 14600 Grm.
 Anfangsgewicht + Einnahmen = 44164 "
 Endgewicht + Ausgaben = 43463,6 "
 24-stünd. Perspiration = 700,4 Grm.

Uebersicht der erhaltenen Resultate:

Datum des Versuchs.	Körpergewicht.	Einnahmen.	Ausgaben.	24-stünd. Perspiration
25. Mai 1885 8 Uhr früh bis	A = 41700 Grm.	2464 Grm.	1863,6 Grm.	700,4 Grm.
26. Mai 1885 8 Uhr früh.	E = 41600 "			

Procentwerthe der Perspiratio insensibilis gegenüber:

Datum des Versuchs.	I. dem Körper- gewicht.	II. den Einnahmen.	III. den Ausgaben.
25.—26. Mai.	1,681	28,425	37,583

Tabelle XII.

24-stündiger Versuch (26.—27. Mai).

Gewicht am 26. Mai 1885 8 Uhr früh = 41600 Grm.

Einnahmen.		Ausgaben.	
Zeit.	Gramm.	Zeit.	Gramm.
8 Uhr Morgens	Milch 100	12 Uhr Mittags	Stuhlgang 65
"	Eier 120	4 " Morgens	" 190
"	Fleisch 205		Harn 1614,4
1 " Mittags	Fleisch 108		
"	Eier 79		
"	Fisch 131		
"	Bouillon 518		
6 " Abends	Eier 145		
"	Fleisch 362		
24-stünd.	Wasser 600		
Summe = 2418 Grm.		Summe = 1869,4 Grm.	

Gewicht am 27. Mai 8 Uhr früh = 41450 Grm.
 Anfangsgewicht + Einnahmen = 44018 "
 Endgewicht + Ausgaben = 43319,4 "
 24-stünd. Perspiration = 698,6 Grm.

Uebersicht der erhaltenen Resultate:

Datum des Versuchs.	Körpergewicht.	Einnahmen.	Ausgaben.	24-stünd Perspiration.
26. Mai 1885 8 Uhr früh bis 27. Mai 1885 8 Uhr früh.	A = 41600 Grm. E = 41450 Grm.	2418 Grm.	1869,4 Grm.	698,6 Grm.

Procentwerthe der Perspiratio insensibilis gegenüber:

Datum des Versuchs.	I. dem Körper- gewicht.	II. den Einnahmen.	III. den Ausgaben.
26.—.27 Mai.	1,682	28,891	37,370

Tabelle XIII.

24-stündiger Versuch (27. — 28. Mai).

Gewicht am 27. Mai 1885 8 Uhr Morgens = 41450 Grm.

E i n n a h m e n.		A u s g a b e n.	
Zeit.	Gramm.	Zeit.	Gramm.
8 Uhr Morgens	Milch 100	6 Uhr Abends	115
"	Eier 120	7 " Morgens	300
"	Fleisch 205	"	1821,2
1 " Mittags	Fleisch 120		
"	Eier 75		
"	Fleisch 326		
"	Bouillon 450		
" Abends	Milch 100		
6 " "	Eier 110		
"	Fleisch 318		
"	Fisch 120		
"	Wasser 770		
24-stünd.			
	Summe = 2814 Grm.		Summe = 2236,2 Grm.

Gewicht am 28. Mai 8 Uhr früh = 41250 Grm.
 Anfangsgewicht + Einnahmen = 44264 "
 Endgewicht + Ausgaben = 43486,2 "
 24-stünd. Perspiration = 777,8 Grm.

Uebersicht der erhaltenen Resultate:

Datum des Versuchs.	Körpergewicht.	Einnahmen.	Ausgaben.	24-stünd. Perspiration.
27. Mai 1885 8 Uhr früh bis 28. Mai 1885 8 Uhr früh.	A = 41450 Grm. E = 41250 "	2814 Grm.	2236,2 Grm.	777,8 Grm.

Procentwerthe der Perspiratio insensibilis gegenüber:

Datum des Versuchs.	I. den Körper- gewicht.	II. den Einnahmen.	III. den Ausgaben.
27.—28. Mai.	1,881	72,640	34,782

Tabelle XIV.

24-stündiger Versuch (28. — 29. Mai).

Gewicht am 28. Mai 1885 8 Uhr früh = 41250 Grm.

E i n n a h m e n.		A u s g a b e n.	
Zeit.	Gramm.	Zeit.	Gramm.
8 Uhr Morgens	Milch 200	3 Uhr Mittags	60
" "	Eier 115	6 " Abends	150
" "	Fleisch 250	12 " Nachts	200
1 " Mittags	Fleisch 110	6 ¹ / ₂ " Morgens	138
" "	Eier 75	" "	1716,8
" "	Fisch 298		
" "	Bouillon 520		
6 " Abends	Milch 200		
" "	Eier 120		
" "	Fleisch 456		
24-stünd.	Wasser 690		
Summe = 3034 Grm.		Summe = 2264,8 Grm.	

Gewicht am 29. Mai 8 Uhr früh = 41250 Grm.
 Anfangsgewicht + Einnahmen = 44284 "
 Endgewicht + Ausgaben = 43514,8 "
 24stünd. Perspiration = 769,2 Grm.

Uebersicht der erhaltenen Resultate:

Datum des Versuchs.	Körpergewicht.	Einnahmen.	Ausgaben.	24stünd. Perspiration.
28. Mai 1885 8 Uhr früh bis 29. Mai 1885 8 Uhr früh.	A = 41250 Grm. E = 41250 "	3034 Grm.	2264,8 Grm.	769,2 Grm.

Procentwerthe der Perspiratio insensibilis gegenüber:

Datum des Versuchs.	I. dem Körper- gewicht.	II. den Einnahmen.	III. den Ausgaben.
28.—29. Mai.	1,864	25,352	33,963

Tabelle XV.

24-stündiger Versuch (29.—30. Mai).

Gewicht am 29. Mai 1885 8 Uhr Morgens = 42150 Grm.

E i n n a h m e n.		A u s g a b e n.	
Zeit	Gramm.	Zeit.	Gramm.
8 Uhr Morgens	Milch 200	6 Uhr Abends.	98
"	Eier 120	3 " Nachts	217
"	Fleisch 221	7 ¹ / ₂ " Morgens	211
1 " Mittags	Fleisch 105	Harn	1716,8
"	Eier 75		
"	Fisch 296		
"	Bouillon 550		
6 " Abends	Milch 200		
"	Eier 120		
"	Fleisch 340		
24-stünd.	Wasser 800		
	Summe = 3027		Summe = 2242,8 Grm.

Gewicht am 30. Mai 8 Uhr früh = 41450 Grm.
 Anfangsgewicht + Einnahmen = 44277 „
 Endgewicht + Ausgaben = 43692,8 „
 24-stünd. Perspiration = 584,2 Grm.

Uebersicht der erhaltenen Resultate:

Datum des Versuchs.	Körpergewicht.	Einnahmen.	Ausgaben.	24-stünd Perspiration.
29. Mai 1885 8 Uhr früh bis 30. Mai 1885 8 Uhr früh.	A = 41250 Grm. E = 41450 „	3027 Grm.	2242,8 Grm.	584,2 Grm.

Procentwerthe der Perspiratio insensibilis gegenüber:

Datum des Versuchs.	I. dem Körper- gewicht.	II. den Einnahmen.	III. den Ausgaben.
29.—30. Mai.	1,412	19,299	26,042

Tabelle XVI.

24-stündiger Versuch (30.—31. Mai).

Gewicht am 30. Mai 1885 8 Uhr Morgens = 41450 Grm.

E i n n a h m e n.		A u s g a b e n.	
Zeit.	Gramm.	Zeit.	Gramm.
8 Uhr Morgens	Milch 200	1 Uhr Nachts	200,5
"	Eier 120	6 " Morgens	178
"	Fleisch 215	"	1802,4
1 " Mittags	Eier 75		
"	Fisch 331		
"	Bouillon 350		
6 " Abends	Eier 75		
"	Fleisch 346		
24-stünd.	Wasser 800		
	Summe = 2512 Grm.		Summe = 2180,9 Grm.

Gewicht am 31. Mai 8 Uhr Morgens = 41200 Grm.
 Anfangsgewicht + Einnahmen = 43962 „
 Endgewicht + Ausgaben = 43380,9 „
 24-stündiger Perspiration = 581,1 Grm.

Uebersicht der erhaltenen Resultate:

Datum des Versuchs.	Körpergewicht.	Einnahmen.	Ausgaben.	24-stünd. Uerspiration.
30. Mai 1885 8 Uhr früh bis 31. Mai 1885 8 Uhr früh.	A = 41450 Grm. E = 41200 „	2512 Grm.	2180,9 Grm.	581,1 Grm.

Procentwerthe der Perspiratio insensibilis gegenüber:

Datum des Versuchs.	I. dem Körper- gewicht.	II. den Einnahmen.	III. den Ausgaben.
30.—31. Mai.	1,406	23,132	26,644

Tabelle XVII.

24-stündiger Versuch (31. Mai bis 1. Juni).

Gewicht am 31. Mai 1885 8 Uhr Morgens = 41200 Grm.

E i n n a h m e n.		A u s g a b e n.	
Zeit.	Gramm.	Zeit.	Gramm.
8 Uhr Morgens	120	2 Uhr Mittags	68
1 " Mittags	200	5 " Morgens	233
" "	100	" "	1156,5
" " Abends	316		
6 " "	200		
" "	75		
" "	130		
24-stünd.	1000		
Summe = 2141 Grm.		Summe = 1457,5 Grm.	

Gewicht am 1. Juni 8 Uhr Morgens = 41500 Grm.
 Anfangsgewicht + Einnahmen = 43341 "
 Endgewicht + Ausgaben = 42957,5 "
 24-stünd. Perspiration = 383,5 Grm.

Uebersicht der erhaltenen Resultate:

Datum des Versuchs.	Körpergewicht.	Einnahmen.	Ausgaben.	24-stünd. Perspiration.
31. Mai 1885 8 Uhr früh bis 1. Juni 1885 8 Uhr früh.	A = 41200 Grm. E = 41500 "	2141 Grm.	1457,5 Grm.	383,5 Grm.

Procentwerthe der Perspiratio insensibilis gegenüber:

Datum des Versuchs.	I. dem Körper- gewicht.	II. den Einnahmen.	III. den Ausgaben.
31. Mai bis 1. Juni.	0,927	13,241	26,312

Tabelle XVIII.

24-stündiger Versuch (1. – 2. Juni).

Gewicht am 1. Juni 1885 8 Uhr Morgens = 41500 Grm.

E i n n a h m e n.		A u s g a b e n.	
Zeit.	Gramm.	Zeit.	Gramm.
8 Uhr Morgens	200	11 Uhr Morgens	75
" "	120	3 " "	308
" Mittags	211	" Harn	1893,4
1 " "	195		
6 " Abends	271		
" "	200		
" "	75		
" "	276		
24-stünd.	1250		
Summe = 2798 Grm.		Summe = 2276,4 Grm.	

Gewicht am 2. Juni 8 Uhr früh = 41650 Grm.
 Anfangsgewicht + Einnahmen = 44298 "
 Endgewicht + Ausgaben = 43926,4 "
 24-stünd. Perspiration = 371,6 Grm.

Uebersicht der erhaltenen Resultate:

Datum des Versuchs.	Körpergewicht.	Einnahmen.	Ausgaben.	24-stünd Perspiration.
1. Juni 1885 8 Uhr früh bis 2. Juni 1885 8 Uhr früh.	A = 41500 Grm. E = 41650 Grm.	2798 Grm.	2276,4 Grm.	371,6 Grm.

Procentwerthe der Perspiratio insensibilis gegenüber:

Datum des Versuchs.	I. dem Körper- gewicht.	II. den Einnahmen.	III. den Ausgaben.
1.—2. Juni.	0,893	13,280	16,324

Tabelle XIX.

24-stündiger Versuch (2—3 Juni).

Gewicht am 2. Juni 1885, 8 Uhr Morgens = 41650 Grm.

E i n n a h m e n.		A u s g a b e n.	
Zeit.	Gramm.	Zeit.	Gramm.
8 Uhr Morgens	200	3 Uhr Nachmittags	130
1 „ Mittags	106	5 „ Morgens	308
„ „	200	„ Harn	1536,9
„ „	120		
„ „	286		
„ „	320		
6 „ Abends	75		
„ „	381		
24-stünd.	740		
	Summe = 2428 Grm.		Summe = 1974,9 Grm.

Gewicht am 3. Juni 8 Uhr früh = 41300 Grm.
 Anfangsgewicht + Einnahmen = 44078 "
 Endgewicht + Ausgaben = 43274,9 "
 24-stünd. Perspiration = 803,1 Grm.

Uebersicht der erhaltenen Resultate:

Datum des Versuchs.	Körpergewicht.	Einnahmen.	Ausgaben.	24-stündige Perspiration.
2. Juni 1885 8 Uhr früh bis	A = 41650 Grm.	2428 Grm.	1974,9 Grm.	803,1 Grm.
3. Juni 1885 8 Uhr früh.	E = 41300 "			

Procentwerthe der Perspiratio insensibilis gegenüber:

Datum des Versuchs.	I. dem Körper- gewicht.	II. den Einnahmen.	III. den Ausgaben.
2.-3. Juni.	1,936	33,076	40,665

Tabelle XX.

24-stündiger Versuch (3.—4. Juni).

Gewicht am 3. Juni 1885 8 Uhr Morgens = 41300 Grm.

E i n n a h m e n.		A u s g a b e n.	
Zeit.	Gramm.	Zeit.	Gramm.
8 Uhr Morgens	Milch 200	6 Uhr Morgens	Stuhlgang 265
"	Fisch 151		Harn 3346,1
"	Fleisch 215		
1 " Mittags	Fleisch 215		
"	Eier 75		
"	Fisch 301		
"	Bouillon 350		
6 " Abends	Milch 200		
"	Eier 120		
"	Fleisch 350		
"	Fisch 221		
24-stünd.	Wasser 1460		
Summe = 3858 Grm.		Summe = 3611,1 Grm.	

Gewicht am 4. Juni 8 Uhr früh = 41400 Grm.
 Anfangsgewicht + Einnahmen = 45158 "
 Endgewicht + Ausgaben = 45011,1 "
 24-stünd. Perspiration = 146,9 Grm.

Uebersicht der erhaltenen Resultate:

Datum des Versuchs.	Körpergewicht.	Einnahmen.	Ausgaben.	24-stünd. Perspiration.
3. Juni 1885 8 Uhr früh bis 4. Juni 1885 8 Uhr früh.	A = 41300 Grm. E = 41400 Grm.	3858 Grm.	3611,1 Grm.	146,9 Grm.

Procentwerthe der Perspiratio insensibilis gegenüber:

Datum des Versuchs.	I. dem Körper- gewicht.	II. den Einnahmen.	III. den Ausgaben.
3.—4. Juni.	0,355	3,807	4,068

Tabelle XXI.

24-stündiger Versuch (4.—5. Juni).

Gewicht am 4. Juni 1885 8 Uhr Morgens = 41400 Grm.

E i n n a h m e n.		A u s g a b e n.	
Zeit.	Gramm.	Zeit.	Gramm.
8 Uhr Morgens	200	Stuhlgang	140
" "	75	" "	170
" Mittags	326	Harn	2639,4
1 " "	216		
" "	75		
" "	276		
" "	355		
6 " Abends	200		
" "	440		
" "	376		
" "	126		
24-stünd.	1000		
Summe = 3665 Grm.		Summe = 2949,4 Grm.	

Gewicht am 5. Juni 8 Uhr früh = 41400 Grm.
 Anfangsgewicht + Einnahmen = 45065 "
 Endgewicht + Ausgaben = 44349,4 "
 24-stünd. Perspiration = 715,6 Grm.

Uebersicht der erhaltenen Resultate:

Datum des Versuchs.	Körpergewicht.	Einnahmen.	Ausgaben.	24-stünd. Perspiration.
4. Juni 1885 8 Uhr früh bis 5. Juni 1885 8 Uhr früh.	A = 41400 Grm. E = 41400 "	3665 Grm.	2949,4 Grm.	715,6 Grm.

Procentwerthe der Perspiratio insensibilis gegenüber:

Datum des Versuchs.	I. dem Körper- gewicht.	II. den Einnahmen.	III. den Ausgaben.
4.—5. Juni	1,728	19,525	24,264

Tabelle XXII.

24-stündiger Versuch (5—6 Juni).

Gewicht am 5. Juni 1885, 8 Uhr Morgens = 14400 Grm.

E i n n a h m e n.		A u s g a b e n.	
Zeit.	Gramm.	Zeit.	Gramm.
8 Uhr Morgens	Milch 200	5 Uhr Morgens	368
"	Eier 120	Stuhlgang	4042,8
"	Fleisch 632	Harn	
1 " Mittags	Fleisch 211		
"	Eier 75		
"	Milch 286		
"	Bouillon 641		
6 " Abends	Milch 100		
"	Fleisch 522		
"	Fisch 236		
24-stünd.	Wasser 1500		
Summe = 4523 Grm.		Summe = 4410,8 Grm.	

Gewicht am 6. Juni 8 Uhr früh = 40750 Grm.
 Anfangsgewicht + Einnahmen = 45923 "
 Endgewicht + Ausgaben = 45160,0 "
 24-stünd. Perspiration = 762,2 Grm.

Uebersicht der erhaltenen Resultate:

Datum des Versuchs.	Körpergewicht.	Einnahmen.	Ausgaben.	24-stünd. Perspiration.
5. Juni 1885 8 Uhr früh bis 6. Juni 1885 8 Uhr früh.	A = 41400 Grm. E = 40750 Grm.	4523 Grm.	4410,8 Grm.	762,2 Grm.

Procentwerthe der Perspiratio insensibilis gegenüber:

Datum des Versuchs.	I. dem Körper- gewicht.	II. den Einnahmen.	III. den Ausgaben.
5.—6. Juni.	1,855	16,851	17,280

Tabelle XXIII.

24-stündiger Versuch (6.—7. Juni).

Gewicht am 6. Juni 1885 8 Uhr Morgens = 40750 Grm.

E i n n a h m e n.		A u s g a b e n.	
Zeit.	Gramm.	Zeit.	Gramm.
8 Uhr Morgens	Milch 200	3 Uhr Nachmittags	Stuhlgang 150
"	Fisch 276	1 1/2 Uhr Nachts	" 300
"	Eier 120		Harn 3031,1
"	Fleisch 216		
1 " Mittag	Fleisch 666		
6 " Abends	Eier 75		
"	Bouillon 425		
"	Fleisch 356		
"	Fisch 296		
"	Wasser 1500		
24-stünd.			
Summe = 4130 Grm.		Summe = 3481,1 Grm.	

Gewicht am 7. Juni 8 Uhr früh == 40970 Grm.
 Anfangsgewicht + Einnahmen == 44880 "
 Endgewicht + Ausgaben == 44451,1 "
 24-stünd. Perspiration == 428,9 Grm.

Uebersicht der erhaltenen Resultate:

Datum des Versuchs.	Körpergewicht.	Einnahmen.	Ausgaben.	24-stünd. Perspiration.
6. Juni 1885 8 Uhr früh bis 7. Juni 1885 8 Uhr früh.	A = 40750 Grm. E = 40970 "	4130 Grm.	3481,1 Grm.	428,9 Grm.

Procentwerthe der Perspiratio insensibilis gegenüber:

Datum des Versuchs.	I. dem Körper- gewicht.	II. den Einnahmen.	III. den Ausgaben.
6.—7. Juni.	1,049	10,385	12,320

Tabelle XXIV.

24-stündiger Versuch (7.—8. Juni).

Gewicht am 7. Juni 1885 8 Uhr Morgens = 40970 Grm.

E i n n a h m e n.		A u s g a b e n.	
Zeit.	Gramm.	Zeit.	Gramm.
8 Uhr Morgens	Fisch 276	12 Uhr Mittags	Stuhlgang 110
"	Eier 75	6 " Abends	" 130
"	Fleisch 326	5 " Morgens	Harn 278
1 " Mittags	Bouillon 201		4105,7
"	Fleisch 366		
"	Eier 120		
"	Fisch 146		
"	Bouillon 710		
6 " Abends	Eier 75		
"	Bouillon 405		
"	Fleisch 326		
"	Fisch 216		
" 24-stünd.	Wasser 2000		
Summe = 5242 Grm.		Summe = 4623,7 Grm.	

Gewicht am 8. Juni 8 Uhr früh = 41150 Grm.
 Anfangsgewicht + Einnahmen = 46212 "
 Endgewicht + Ausgaben = 45773,7 "
 24-stünd. Perspiration = 438,3 Grm.

Uebersicht der erhaltenen Resultate:

Datum des Versuchs.	Körpergewicht.	Einnahmen.	Ausgaben.	24-stünd. Perspiration.
7. Juni 1885 8 Uhr früh bis 8. Juni 1885 8 Uhr früh.	A = 40970 Grm. E = 41150 "	5242 Grm.	4623,7 Grm.	438,3 Grm.

Procentwerthe der Perspiratio insensibilis gegenüber:

Datum des Versuchs.	I. dem Körper- gewicht.	II. den Einnahmen.	III. Ausgaben.
7.—8. Juni.	1,067	8,361	9,479

Tabelle XXV.

24-stündiger Versuch (8—9 Juni).

Gewicht am 8. Juni 1885, 8 Uhr Morgens = 41150 Grm.

E i n n a h m e n.		A u s g a b e n.	
Zeit.	Gramm.	Zeit.	Gramm.
8 Uhr Morgens	Fleisch 170	12 Uhr Mittags	120
"	Eier 75	2 1/2 " Nachts	160
"	Fleisch 396	" Harn	3937,2
"	Bouillon 315		
1 Uhr Mittags	Fleisch 261		
"	Eier 75		
"	Fisch 291		
"	Bouillon 792		
6 Uhr Abends	Eier 40		
"	Bouillon 460		
"	Fleisch 325		
"	Fisch 241		
"	Wasser 1500		
24-stünd.			
Summe = 4931 Grm.		Summe = 4217,2 Grm.	

Gewicht am 9. Juni 8 Uhr früh = 41250 Grm.
 Anfangsgewicht + Einnahmen = 46091 "
 Endgewicht + Ausgaben = 45467,2 "
 24-stünd. Perspiration = 623,8 Grm.

Uebersicht der erhaltenen Resultate :

Datum des Versuchs.	Körpergewicht.	Einnahmen.	Ausgaben.	24-stünd. Perspiration.
8. Juni 1885 8 Uhr früh bis 9. Juni 1885 8 Uhr früh.	A = 41150 Grm. E = 41250 "	4941 Grm.	4217,2 Grm.	623,8 Grm.

Procentwerthe der Perspiratio insensibilis gegenüber:

Datum des Versuchs.	I. dem Körper- gewicht.	II. den Einnahmen.	III. den Ausgaben.
8.—9. Juni.	1,514	12,624	14,791

Tabelle XXVI.

24-stündiger Versuch (9.—10. Juni).

Gewicht am 9. Juni 1885 8 Uhr Morgens = 41250 Grm.

E i n n a h m e n.		A u s g a b e n.	
Zeit.	Gramm.	Zeit.	Gramm.
8 Uhr Morgens	Fisch 210	12 1/4 Uhr Nachts	Stuhlgang 300
"	Eier 120		Harn 4178,8
"	Fleisch 320		
"	Bouillon 520		
1 " Mittags	Fleisch 210		
"	Eier 75		
"	Fisch 300		
"	Bouillon 740		
6 " Abends	Eier 75		
"	Bouillon 375		
"	Fleisch 625		
"	Fisch 322		
24-stündl.	Wasser 1050		
Summe = 4942 Grm.		Summe = 4478,8 Grm.	

Gewicht am 10. Juni 8 Uhr früh = 41300 Grm.
 Anfangsgewicht + Einnahmen = 46192 "
 Endgewicht + Ausgaben = 45778,8 "
 24stünd. Perspiration = 413,2 Grm.

Uebersicht der erhaltenen Resultate:

Datum des Versuchs.	Körpergewicht.	Einnahmen.	Ausgaben.	24-stünd. Perspiration.
9. Juni 1885	A = 41250 Grm.	4942 Grm.	4478,8 Grm.	413,2 Grm.
8 Uhr früh bis 10. Juni 1885	E = 41300 "			
8 Uhr früh.				

Procentwerthe der Perspiratio insensibilis gegenüber:

Datum des Versuchs.	I. dem Körper- gewicht.	II. den Einnahmen.	III. den Ausgaben.
9.—10. Juni.	1,001	8,360	9,225

Tabelle XXVII.

24-stündiger Versuch (10.—11. Juni).

Gewicht am 10. Juni 1885 8 Uhr Morgens = 41300 Grm.

E i n n a h m e n.		A u s g a b e n.	
Zeit.	Grhmm.	Zeit.	Gramm.
8 Uhr Morgens	Fisch 210	9 ¹ / ₂ Uhr Morgens	90
"	Eier 120	3 " Nachmitt.	100
"	Fleisch 320	12 " Nachts	220
"	Bouillon 520	"	4399
1 " Mittags	Fleisch 210	Stuhlgang	
"	Eier 75	"	
"	Fisch 300	"	
"	Bouillon 740	Harn	
6 " Abends	Eier 75		
"	Bouillon 375		
"	Fleisch 625		
"	Fisch 322		
24-stünd.	Wasser 1500		
Summe = 5392 Grm.		Summe = 4809 Grm.	

Gewicht am 11. Juni 8 Uhr früh = 41200 Grm.
 Anfangsgewicht + Einnahmen = 46692 "
 Endgewicht + Ausgaben = 46009 "
 24-stünd. Perspiration = 683 Grm.

Uebersicht der erhaltenen Resultate:

Datum des Versuchs.	Körpergewicht.	Einnahmen.	Ausgaben.	24-stünd Perspiration.
10. Juni 1885 8 Uhr früh bis 11. Juni 1885 8 Uhr früh.	A = 41300 Grm. E = 41200 Grm.	5392 Grm.	4809 Grm.	683 Grm.

Procentwerthe der Perspiratio insensibilis gegenüber:

Datum des Versuchs.	I. dem Körper- gewicht.	II. den Einnahmen.	III. den Ausgaben.
10. — 11. Juni.	1,655	12,667	14,202

Tabelle XXVIII.

24-stündiger Versuch (11.—12. Juni).

Gewicht am 11. Juni 1885 8 Uhr Morgens = 41200 Grm.

E i n n a h m e n.		A u s g a b e n.	
Zeit.	Gramm.	Zeit.	Gramm.
8 Uhr Morgens	Fisch 210	11 Uhr Vormittags	Stuhlgang 110
"	Eier 420	6 " Abends	" 100
"	Fleisch 320	12 ¹ / ₄ " Nachts	Harn 258
1 " Mittags	Bouillon 520		4080
"	Fleisch 210		
"	Eier 75		
"	Fisch 300		
"	Bouillon 740		
6 " Abends	Eier 75		
"	Bouillon 375		
"	Fleisch 625		
"	Fisch 167		
"	Wasser 1500		
24-stünd.			
Summe = 5237 Grm.		Summe = 4548 Grm.	

Gewicht am 12. Juni 8 Uhr früh = 41300 Grm.
 Anfangsgewicht + Einnahmen = 46437 „
 Endgewicht + Ausgaben = 45848 „
 24-stünd. Perspiration = 589 Grm.

Uebersicht der erhaltenen Resultate:

Datum des Versuchs.	Körpergewicht.	Einnahmen.	Ausgaben.	24-stünd. Perspiration.
11. Juni 1885 8 Uhr früh bis 12. Juni 1885 8 Uhr früh.	A = 41200 Grm. E = 41300 Grm.	5237 Grm.	4548 Grm.	589 Grm.

Procentwerthe der Perspiratio insensibilis gegenüber:

Datum des Versuchs.	I. dem Körper- gewicht.	II. den Einnahmen.	III. den Ausgaben.
11.—12. Juni.	1,427	11,246	12,950

Tabelle XXIX.

24-stündiger Versuch (12.—13. Juni).

Gewicht am 12. Juni 1885 8 Uhr früh = 41300 Grm.

E i n n a h m e n.		A u s g a b e n.	
Zeit.	Gramm.	Zeit.	Gramm.
8 Uhr Morgens	Fisch 210	10 Uhr Vormittags	201
"	Eier 120	3 ³ / ₄ „ Nachts	55
"	Fleisch 320	"	4482,1
"	Bouillon 520		
1 „ Mittags	Fleisch 210		
"	Eier 75		
"	Fisch 300		
"	Bouillon 740		
"	Eier 75		
6 „ Abends	Bouillon 375		
"	Fleisch 625		
"	Fisch 322		
"	Wasser 1500		
24-stünd.			
Summe = 5392 Grm.		Summe = 4738,1 Grm.	

Gewicht am 13. Juni 8 Uhr Morgens = 41600 Grm.
 Anfangsgewicht + Einnahmen = 46692 "
 Endgewicht + Ausgaben = 46338,1 "
 24-stündiger Perspiration = 353,9 Grm.

Uebersicht der erhaltenen Resultate:

Datum des Versuchs.	Körpergewicht.	Einnahmen.	Ausgaben.	24-stünd. Uerspiration.
12. Juni 1885 8 Uhr früh bis 13. Juni 1885 8 Uhr früh.	A = 41300 Grm. E = 41600 "	5392 Grm.	4738,1 Grm.	353,9 Grm.

Procentwerthe der Perspiratio insensibilis gegenüber:

Datum des Versuchs.	I. dem Körper- gewicht.	II. den Einnahmen.	III. den Ausgaben.
12.—13. Juni.	0,426	6,563	7,469

Tabelle XXX.

24-stündiger Versuch (13.—14. Juni).

Gewicht am 13. Juni 1885 8 Uhr Morgens = 41600 Grm.

E i n n a h m e n.		A u s g a b e n.	
Zeit.	Gramm.	Zeit.	Gramm.
8 Uhr Morgens	Fisch 210	10 ¹ / ₂ Uhr Vormittags	Stuhlgang 200
"	Eier 120	2 ¹ / ₄ " Nachts	" 355
"	Fleisch 320		Harn 4045,2
"	Bouillon 520		
1 " Mittags	Fleisch 210		
"	Eier 75		
"	Fisch 300		
"	Bouillon 740		
6 " Abends	Eier 75		
"	Bouillon 375		
"	Fleisch 625		
"	Fisch 322		
24-stünd.	Wasser 1500		
Summe = 5392 Grm.		Summe = 4600,2 Grm.	

Gewicht am 14. Juni 8 Uhr früh = 41500 Grm.
 Anfangsgewicht + Einnahmen = 46992 "
 Endgewicht + Ausgaben = 46100,2 "
 24-stünd. Perspiration = 891,8 Grm.

Uebersicht der erhaltenen Resultate:

Datum des Versuchs.	Körpergewicht.	Einnahmen.	Ausgaben.	24-stündige Perspiration.
13. Juni 1885 8 Uhr früh bis 14. Juni 1885 8 Uhr früh.	A = 41600 Grm. E = 41500 "	5392 Grm.	4600,2 Grm.	981,8 Grm.

Procentwerthe der Perspiration insensibilis gegenüber:

Datum des Versuchs.	I. dem Körper- gewicht.	II. den Einnahmen.	III. den Ausgaben.
13.--14. Juni.	2,146	16,535	19,342

Tabelle XXXI.

24-stündiger Versuch (14.—15. Juni).

Gewicht am 14. Juni 1885 8 Uhr Morgens = 41500 Grm.

E i n n a h m e n.		A u s g a b e n.	
Zeit.	Gramm.	Zeit.	Gramm.
8 Uhr Morgens	210	9 Uhr Morgens	105
" "	120	1 1/2 Uhr Nachts	154
" "	320	" "	3957,8
" Mittags	520		
1 " "	210		
" "	75		
" "	300		
" "	740		
" Abends	75		
6 " "	375		
" "	625		
" "	322		
" "	2335		
24-stünd.			
Summe = 6227 Grm.		Summe = 4216,8 Grm.	

Gewicht am 15. Juni 8 Uhr früh = 42800 Grm.
 Anfangsgewicht + Einnahmen = 47727 "
 Endgewicht + Ausgaben = 47016,8 "
 24-stünd. Perspiration = 710,2 Grm.

Uebersicht der erhaltenen Resultate:

Datum des Versuchs.	Körpergewicht.	Einnahmen.	Ausgaben.	24-stünd. Perspiration.
14. Juni 1885 8 Uhr früh bis 15. Juni 1885 8 Uhr früh.	A = 41500 Grm. E = 42800 "	6227 Grm.	4216,8 Grm.	710,2 Grm.

Procentwerthe der Perspiratio insensibilis gegenüber:

Datum des Versuchs.	I. dem Körper- gewicht.	II. den Einnahmen.	III. den Ausgaben.
14.—15. Juni	1,680	11,305	16,842

Uebersichtliche Zusammenstellung der erhaltenen Resultate (Perspiratio insensibilis).

Datum des Versuchs.	Körpergewicht in Grm.	Einnah- men in Grm.	Ausgaben in Grm.	24-stündige Perspiratio insensibilis in Grm.
15.—16. Mai	Anfangsgewicht			
	45600			
	Endgewicht	3929	3782	287
	45460			
16.—17. „	A = 45460	2970	2740,1	929,9
	E = 44760			
17.—18. „	A = 44760	3751	3170,5	820,5
	E = 44520			
18.—19. „	A = 44520	3201	3230	991
	E = 43500			
19.—20. „	A = 43500	2463	3391,3	801,7
	E = 41770			
20.—21. „	A = 41770	3809	3717,5	211,5
	E = 41650			
21.—22. „	A = 41650	3525	2700,9	824,1
	E = 41650			
22.—23. „	A = 41650	3542	2616,3	575,7
	E = 42000			
23.—24. „	A = 42000	2170	1933,6	686,4
	E = 41550			
24.—25. „	A = 41550	2976	2027,9	798,1
	E = 41700			
25.—26. „	A = 41700	2464	1863,6	700,4
	E = 41600			
26.—27. „	A = 41600	2418	1869,4	698,6
	E = 41450			
27.—28. „	A = 41450	2814	2236,2	777,8
	E = 41250			
28.—29. „	A = 41250	3034	2264,8	769,2
	E = 41250			
29.—30. „	A = 41250	3027	2242,8	584,2
	E = 41450			

Datum des Versuches.	Körpergewicht in Grm.	Einnah- men in Grm.	Ausgaben in Grm.	24-stündige Perspiratio insensibilis in Grm.
	Anfangsgewicht 41450			
30.—31. Mai	Endgewicht 41200	2512	2180,9	581,1
31. Mai bis 1. Juni	A = 41200 E = 41500	2141	1457,5	383,5
1.— 2. Juni	A = 41500 E = 41650	2798	2276,4	371,6
2.— 3. „	A = 41650 E = 41300	2428	1974,9	803,1
3.— 4. „	A = 41300 E = 41400	3858	3611,1	146,9
4.— 5. „	A = 41400 E = 41400	3665	2949,4	715,6
5.— 6. „	A = 41400 E = 40750	4523	4410,8	762,2
6.— 7. „	A = 40750 E = 40970	4130	3481,1	428,9
7.— 8. „	A = 40970 E = 41150	5242	4623,7	438,3
8.— 9. „	A = 41150 E = 41250	4941	4217,2	623,8
9.—10. „	A = 41250 E = 41300	4942	4478,8	413,2
0.—11. „	A = 41300 E = 41200	5392	4809	683
1.—12. „	A = 41200 E = 41300	5237	4548	589
2.—13. „	A = 41300 E = 41600	5392	4738,1	353,9
3.—14. „	A = 41600 E = 41500	5392	4600,2	891,8
4.—15. „	A = 41500 E = 42800	6227	4216,8	710,2

**Uebersichtliche Zusammenstellung der Procentwerthe der
Perspiratio insensibilis gegenüber:**

Datum des Versuches.	I. dem Körper- gewicht.	II. den Ein- nahmen.	III. den Ausgaben.
15.—16. Mai.	0,63	7,302	7,588
16.—17. „	2,061	31,309	33,936
17.—18. „	1,838	21,874	25,879
18.—19. „	2,251	30,959	30,681
19.—20. „	1,88	32,549	23,639
20.—21. „	0,507	5,552	5,689
21.—22. „	1,978	30,512	23,378
22.—23. „	1,376	16,253	22,004
23.—24. „	1,643	31,631	35,498
24.—25. „	1,917	26,817	39,355
25.—26. „	1,681	28,425	37,583
26.—27. „	1,682	28,891	37,370
27.—28. „	1,881	27,640	34,782
28.—29. „	1,864	25,352	33,963
29.—30. „	1,412	19,299	26,042
30.—31. „	1,406	23,132	26,644
31. Mai — 1. Juni	0,927	13,241	26,312
1.—2. Juni.	0,893	13,280	16,324
2.—3. „	1,936	33,076	40,665
3.—4. „	0,355	3,807	4,068
4.—5. „	1,728	19,525	24,264
5.—6. „	1,855	16,851	17,280
6.—7. „	1,049	10,385	12,320
7.—8. „	1,067	8,361	9,479
8.—9. „	1,514	12,624	14,791
9.—10. „	1,001	8,360	9,225
10.—11. „	1,655	12,667	14,202
11.—12. „	1,427	11,246	12,950
12.—13. „	0,426	6,563	7,469
13.—14. „	2,146	16,535	19,342
14.—15. „	1,680	11,305	16,842

IX.

Phenolbestimmung.

Die Methode von Nencki und Sieber zum Zweck des Nachweises der physiologischen Oxydation wurde zweimal bei unserem Pat. ausgeführt.

Von der Thatsache ausgehend, dass Benzol im Organismus nach den Angaben von Nencki und Giacosa¹⁾ zu Phenol, Hydrochinon und Brenzcatechin oxydirt, und nach Eingabe von Benzol wie Schultzen und Naunyn²⁾ es feststellten, im Harn Phenol ausgeschieden werde, benutzten Nencki und Sieber, Munk und And. die Eingabe von Benzol, um die Intensität der Oxydation bei verschiedenen Krankheiten zu messen. Wie aus den Angaben in der Literatur ersichtlich ist diese Methode bequem und mit hinreichender Genauigkeit ausführbar.

Es ist, sagt Munk³⁾, sichergestellt, dass ein nicht unerheblicher Theil des aufgenommenen Ben-

1) Zeitsch. f. Chem. Bd. 4.

2) Schultzen und Naunyn, Archiv. f. Anatomie und Physiol. 1867.

3) Emanuel Munk. Zur Kenntniss der phenolbildenden Substanz im Harn. Pflügers Archiv f. Physiol. Bd. 12, p. 149.

zol im Organismus eine derartige Veränderung eingeht, dass es in eine organische Atomgruppe eintritt und mit ihr zusammen die phenolbildende Substanz giebt.«

Die zahlreichen Untersuchungen von Brieger ¹⁾ bei den verschiedenen Krankheiten ergaben so erhebliche Abweichungen von der vom Gesunden gewöhnlich ausgeschiedenen Phenolmenge, dass eine Zu- oder Abnahme der normalen ausgeschiedenen Phenolmenge bei den von Brieger beobachteten verschiedenen Krankheiten zugegeben werden muss.

Wenngleich die Bestimmung des noch im gesunden Zustande oxydirbaren Benzols bei einem Diabetiker zum Zweck des Vergleiches mit der im kranken Zustande ausgeschiedenen Phenolmenge der seltenen Heilung wegen in der Regel unmöglich sein wird, so könnte doch eine grosse Reihe von dergleichen Untersuchungen an Diabetikern dankbare Aufschlüsse durch Vergleich der geringeren oder grösseren Oxydationsfähigkeit des diabetischen Organismus geben. Aus diesem Grunde wurden folgende Phenolbestimmungen angestellt.

Der Harn enthielt normaler Weise

am 27. Mai 0,0154

„ 28. „ 0,0267

1) L. Brieger: Einige Beziehungen der Fäulnisproducte zu Krankheiten. Zeitsch. für klin. Med. Bd. 3. p. 465.

am 30. Mai 0,0123
 „ 31. „ 0, 025
 „ 1. Juni 0,0324
 „ 2. „ 0,0215

Am 9. Juni erhielt Pat. 2,1 gr. Benzol. Die ausgeschiedene Phenolmenge betrug:

Tag.	Phenol.
9—10 Juni	0,316
10—11 „	0,014
11—12 „	0,007

Am 12. Juni erhielt Pat 2,0 gr. Benzol. Die ausgeschiedene Phenolmenge betrug:

Tag.	Phenol.
12—13 Juni	0,0596
13—14 „	0,0022
14—15 „	0,0014

Pat. wurde vom 12.—13. Juni fünf Mal zu je einer Stunde kräftig massirt.

Literatur.

- H. Senator: Diabetes mellitus und insipidus. Ziemssen Handb. der speciell. Pathol. und Therapie. Bd. XIII, 2.
- Fr. Th. von Frerichs: Ueber den Diabetes. Berlin 1884.
- C. Bock und F. A. Hoffmann: Experimital-Studien über Diabetes. Berlin 1874.
- J. Seegen: Der Diabetes mellitus. Berlin 1875.
- A. Cantani: Dar Diabetes melitus. Berlin 1877.
- E. Külz: Beiträge zur Pathol. und Therap. des Diabetes mell. Bd. I und II. Marburg.
- M. Salomon: Geschichte der Glycosurie. Deutsches Archiv f. klin. Med. VIII.
- M. Traube: Ueber die Gesetze der Zuckerausscheidungen. Virchow Archiv Bd. 4.
- Schultzen und Naunyn: Archiv f. Anatomie und Physiol. 1867.
- L. Brieger: Einige Beziehungen der Fäulnisproducte zu Krankheiten. Zeitsch. f. klin. Med. Bd. 3. p. 465.
- Lecorche: Traité du Diabète. Paris 1877.
- C. Gaetgens: Ueber den Stoffwechsel eines Diabetikers verglichen mit dem eines Gesunden. Doc. Diss. Dorpat 1866.

- J. Munk: Zur Kenntniss der phenolbildenden Substanz im Harn. Pflüger's Archiv f. Physiologie Bd. 12. p. 142.
- M. Nencki und N. Sieber: Ueber eine neue Methode die physiologische Oxydation zu messen etc. Pflügers Archiv Bd. 31. p. 319.
- Naunyn: Beiträge z. Lehre vom Diab. mell. Archiv f. experim. Pathol. III, p. 83.
- C. Bernard: Leçons sur le Diabète et la Glycogenèse animale. Paris 1877.
- K. Zimmer: Die Muskeln eine Quelle, Muskelarbeit ein Heilmittel bei Diabetes. Karlsbad 1880.
- K. Zimmer: Ein Beitrag zur Lehre vom Diabetes mellitus. Karlsbad 1883.
- J. Rollo: On diabetes mellitus. London 1797.
- F. v. Recklinghausen: Drei Fälle von Diabetes mell. Virchow Archiv. Bd. 30.
- Kratschner: Ueber die Wirkung des Opiums und Morphinus bei Diab. mell. Wiener med. Wochensch. 1871.
- F. Bürger: Ueber die Perspirat. insensibil. bei Diabetes mell. und insip. Deutsch. Archiv f. klin. Med. Bd. 11.
- G. Weiss: Ueber die Quelle des Leberglycogens. Wiener acad. Sitzungsber. Bd. 67, 3.
- Kussmaul: Zur Lehre v. Diabetes mell. etc. Deutsches Archiv f. klin. Medicin Bd. 14, p. 1.
- L. Senff: Ueber den Diabet. nach Kohlenoxydathmung. Diss. Dorpat 1869.
- F. W. Dock: Ueber die Glycogenbildung in der Leber und ihre Beziehung zum Diabetes. Pflügers Archiv Bd. 5, p. 571.

- Schiff: Untersuchungen über die Zuckerbildung in der Leber. Würzburg 1859. Archiv f. physiolog. Heilkunde.
- Nencki und Giacosa: Zeitschrift f. phys. chemie Bd. 4.
- Hoppe-Seiler: Handb. der physiol. und pathologisch-chem. Analyse. Berlin 1883.
- W. F. Loebisch: Anleitung zu Harnanalyse.
- W. Krukenberg: Grundriss der medicinisch-chem. Analyse. Heidelberg 1884.
-

Inhaltsverzeichnis.

I. Einleitung	7
II. Anamnese und Status praesens	10
III. Untersuchungsplan	14
IV. Tägl. Beobachtungen.	24
V. Resultate der tägl. Untersuchungen	37
VI. Besprechung der Untersuchungsbefunde	49
VII. Ueber den Einfluss der Massage bei Diabetes mellitus	79
VIII. Einunddreissigtägige geschlossene Versuchsreihe über das Verhalten der Perspiratio insensibilis bei Diabetes mellitus	83
IX. Phenolbestimmung	151
Literatur	154

Thesen.

1. Es giebt zwei Stadien, nicht zwei Formen von Diabetes mellitus.
 2. Die Erfolge der Karlsbader Trinkkuren bei Diabetes mellitus sind zweifelhaft.
 3. Die Verhütung von Scoliosen liegt in der Hand des Hausarztes.
 4. Die Massage muss in der inneren Medicin mehr Verwerthung finden.
 5. Bei febris intermittens ist der subcutanen Injection von Chin. muriat. unter allen medicamentösen Behandlungsmethoden der Vorzug zu geben.
 6. Das beste Mittel gegen Kopfschmerzen sind kalte Sitzbäder.
 7. Heilanstalten für Phthisiker sind zu verwerfen.
-

